



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
(Минздрав ЧР)

ПРИКАЗ

«01 10, 2019 г.

г. Грозный

№ 214

Г Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» в Чеченской Республике

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)»» (с изменениями – приказ Минздрава РФ от 17.01.2014 г. № 25н «О внесении изменений к порядку оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология»»), клинических рекомендаций (протокола лечения) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02 октября 2015 г. № 15-4/10/2-5802 «Организация медицинской эвакуации беременных женщин, рожениц и родильниц при неотложных состояниях», и в целях обеспечения доступности и качества оказания медицинской помощи женскому населению в медицинских организациях Чеченской Республики,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
  - 1.1. Порядок оказания медицинской помощи женщинам по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» в Чеченской Республике (далее - Порядок), согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

1.2. Лист маршрутизации беременных женщин при проведении пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

1.3. Форму протокола ультразвукового обследования женщины в 11-14 недель беременности, согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

1.4. Форму протокола скринингового ультразвукового обследования женщины во II – III триместрах беременности, согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

1.5. Лист маршрутизации женщин в период беременности и родов при акушерской патологии, согласно приложению № 5 к настоящему приказу;

1.6. Лист маршрутизации женщин в период беременности и послеродовой период с экстрагенитальной патологией, нуждающихся в лечении в специализированном отделении, согласно приложению № 6 к настоящему приказу;

1.7. Положение о дистанционном акушерском консультативном центре, согласно приложению № 7 к настоящему приказу;

1.8. Форму карты консультации с дистанционным акушерским консультативным центром, согласно приложению № 8 к настоящему приказу;

1.9. Форму карты транспортировки, согласно приложению № 9 к настоящему приказу;

1.10. Форму информированного добровольного согласия на проведение искусственного прерывания беременности по желанию женщины, согласно приложению № 10 к настоящему приказу.

2. Главному врачу ГБУ «Родильный дом»:

2.1. Организовать работу дистанционного акушерского консультативного центра в соответствие с Положением о дистанционном акушерском консультативном центре;

2.2. Дистанционный акушерский консультативный центр оборудовать и укомплектовать согласно штатному расписанию в соответствии с приложениями №№ 14,15 к приказу Минздрава РФ от 1 ноября 2012 года № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)»».

3. Главным врачам медицинских организаций Чеченской Республики:

3.1. Организовать оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период в соответствии с Порядком;

3.2. Привести в соответствие с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология

(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)»» (с изменениями – приказ МЗ РФ от 17.01.2014 г. № 25н «О внесении изменений к порядку оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология»») штатное расписание и материально-техническое оснащение акушерских стационаров.

4. Признать утратившими силу: приказ Министерства здравоохранения Чеченской Республики от 28.06.2019 г. № 133 «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования репродуктивных технологий)» в Чеченской Республике».

5. Общему отделу ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Министерства здравоохранения Чеченской Республики» довести настоящий приказ до руководителей медицинских организаций, ГБУ «Станция скорой медицинской помощи», администрации ТФОМС и страховой компании «МАКС-М» и разместить (опубликовать) на официальном сайте Минздрава ЧР.

6. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Чеченской Республики А.А. Гадаева.

Министр

Э.А. Сулейманов

## Порядок

### **оказания медицинской помощи женщинам по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» в Чеченской Республике.**

Настоящий Порядок регулирует вопросы оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» в Чеченской Республике.

Действие Порядка распространяется на организации здравоохранения Чеченской Республики, оказывающие акушерскую и гинекологическую медицинскую помощь.

#### **I. Порядок оказания медицинской помощи женщинам в период беременности.**

1. Медицинская помощь женщинам в период беременности оказывается в рамках первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, и скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по «акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» и (или) «акушерскому делу».

2. Порядок оказания медицинской помощи женщинам в период беременности включает в себя два основных этапа:

- амбулаторный, осуществляемый врачами-акушерами-гинекологами, а в случае их отсутствия при физиологически протекающей беременности врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими работниками фельдшерско-акушерских пунктов (при этом, в случае возникновения осложнения течения беременности должна быть обеспечена консультация врача-акушера-гинеколога и врача-специалиста по профилю заболевания);

- стационарный, осуществляемый в отделениях патологии беременности (при акушерских осложнениях) или специализированных отделениях (при соматических заболеваниях) медицинских организаций.

3. Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности осуществляется в соответствии с настоящим Порядком на основании листов маршрутизации, с учетом возникновения осложнений в период беременности, в том числе при экстрагенитальных осложнениях.

4. При физиологическом течении беременности осмотры беременных женщин проводятся:

- врачом-акушером-гинекологом - не менее семи раз,
- врачом-терапевтом - не менее двух раз,

- врачом-стоматологом - не менее двух раз,
- врачом-оториноларингологом, врачом-офтальмологом - не менее одного раза (не позднее 7-10 дней после первичного обращения в женскую консультацию),
- другими врачами-специалистами - по показаниям, с учетом сопутствующей патологии.

## **5. Порядок проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка.**

5.1. Для проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка лаборатория ГБУ «Родильный дом» оснащена биохимическим анализатором для проведения биохимического скрининга на наследственные заболевания, куда направляются беременные женщины или доставляются образцы крови для исследования из всех женских консультаций республики.

Порядок маршрутизации беременных женщин для проведения пренатальной диагностики проводится по листу маршрутизации в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.

5.2. Скрининговое ультразвуковое исследование (далее - УЗИ) проводится трехкратно: при сроках беременности 11 - 14 недель, 18 - 21 недель и 30 - 34 недель.

При сроке беременности 11 - 14 недель беременная женщина проходит экспертный уровень пренатальной диагностики нарушений развития ребенка, включающей проведение ультразвукового скринингового обследования в I триместре, на ультразвуковом аппарате экспертного класса, обязательно врачом ультразвуковой диагностики, имеющим сертификат врача-эксперта FMF (фонд медицины плода), и определение материнских сывороточных маркеров (связанного с беременностью плазменного протеина А (PAPP-A) и свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина) с последующим программным комплексным расчетом индивидуального риска рождения ребенка с хромосомной патологией.

При сроке беременности 18 - 21 неделя беременной женщине проводится УЗИ для исключения поздно манифестирующих врожденных аномалий развития плода. Второй ультразвуковой скрининг беременная женщина может пройти в любой медицинской организации, но на ультразвуковом аппарате экспертного класса.

При сроке беременности 30 - 34 недель УЗИ проводится по месту наблюдения беременной женщины (желательно на ультразвуковом аппарате экспертного класса).

5.3. Протокол скринингового ультразвукового исследования в сроках беременности 11 - 14 недель оформляется в соответствии с приложением № 3 к настоящему приказу.

Протокол скринингового ультразвукового исследования во II – III триместрах беременности оформляется в соответствии с приложением № 4 к настоящему приказу.

5.4. При поздней первой явке во II триместре, делается забор крови для проведения биохимического анализа крови на альфа-фетопротеин, эстриол, бета-ХГ (в сроке 16 - 18 недель). Если в указанные сроки беременная женщина находится на стационарном лечении и ей не выполнено обследование на

амбулаторном этапе, то необходимо организовать проведение пренатальной диагностики в стационаре по той же схеме.

5.5. При установлении у беременной женщины высокого риска по хромосомным нарушениям у плода (индивидуальный риск 1/100 и ниже) в I триместре беременности и (или) выявлении врожденных аномалий (пороков развития) у плода в I, II и III триместрах беременности врач-акушер-гинеколог направляет ее в поликлиническое отделение ГБУ «Родильный дом» к врачу - генетику. При согласии женщины на проведение инвазивных методов обследования, она направляется в гинекологическое отделение ГБУ «Родильный дом» (или в другую медицинскую организацию в рамках базовой программы ОМС, по желанию женщины).

В случае отказа женщины от иногороднего лечения, определение дальнейшей тактики ведения беременности осуществляется перинатальным консилиумом врачей, функционирующим на базе ГБУ «Родильный дом».

В случае постановки диагноза хромосомных нарушений и врожденных аномалий (пороков развития) у плода с неблагоприятным прогнозом для жизни и здоровья ребенка после рождения, прерывание беременности по медицинским показаниям проводится независимо от срока беременности по решению перинатального консилиума врачей после получения информированного добровольного согласия беременной женщины.

Госпитализация женщины в сроке беременности до 22 недель осуществляется в гинекологические отделения медицинских организаций в соответствие с уровнем.

С целью искусственного прерывания беременности по медицинским показаниям при сроке до 22 недель беременная женщина направляется в гинекологическое отделение. Прерывание беременности (родоразрешение) в 22 недели и более проводится в условиях обсервационного отделения акушерского стационара.

5.6. При пренатально диагностированных врожденных аномалиях (пороках развития) у плода необходимо проведение перинатального консилиума врачей, состоящего из врача-генетика, врача-акушера-гинеколога, врача-неонатолога и врача - детского хирурга. Если по заключению перинатального консилиума врачей возможна хирургическая коррекция в неонатальном периоде в ГБУ «Родильный дом», родоразрешение планируется в данном родильном доме, в случае отсутствия условий для хирургического вмешательства в республике направление беременных женщин для родоразрешения осуществляется в ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава РФ или ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава РФ.

5.7. При наличии врожденных аномалий (пороков развития) плода, требующих оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи плоду или новорожденному в перинатальном периоде, проводится консилиум врачей, в состав которого входят врач-акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, врач-генетик, врач-неонатолог, врач - детский кардиолог и врач - детский хирург и выносится заключение с определением медицинской организации для родоразрешения и дальнейшего лечения. При необходимости иногороднего лечения в федеральных медицинских организациях,

готовится пакет документов на иногороднее лечение беременной женщине по месту диспансерного наблюдения или новорожденному в детской поликлинике.

6. Основной задачей диспансерного наблюдения женщин в период беременности является предупреждение прерывания беременности при отсутствии медицинских и социальных противопоказаний, и ее сохранение, профилактика и ранняя диагностика возможных осложнений беременности, родов, послеродового периода и патологии новорожденных.

При постановке беременной женщины на учет в соответствии с заключениями профильных врачей-специалистов врачом-акушером-гинекологом до 11-12 недель беременности делается заключение о возможности вынашивания беременности.

Окончательное заключение о возможности вынашивания беременности с учетом состояния беременной женщины и плода делается врачом-акушером-гинекологом до 22 недель беременности.

7. Для искусственного прерывания беременности по медицинским показаниям при сроке до 22 недель беременности женщины направляются в гинекологические отделения медицинских организаций II или III группы, имеющих возможность оказания специализированной (в том числе реанимационной) медицинской помощи (при наличии врачей-специалистов соответствующего профиля, по которому определены показания для искусственного прерывания беременности).

8. Этапность оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде определена приложением № 5 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)»».

9. При угрожающем аборте, лечение беременной женщины осуществляется в гинекологических отделениях.

10. Врачи женских консультаций осуществляют плановое направление в стационар беременных женщин на родоразрешение с учетом степени риска возникновения осложнений в родах.

Правила организации деятельности женской консультации, рекомендуемые штатные нормативы и стандарт оснащения женской консультации, правила организации деятельности врача-акушера-гинеколога женской консультации определены приложениями № 1 - 4 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)»».

11. При экстрагенитальных заболеваниях, требующих стационарного лечения, беременная женщина направляется в профильное отделение медицинских организаций, вне зависимости от срока беременности, при условии совместного наблюдения и ведения врачом-специалистом по профилю заболевания и врачом-акушером-гинекологом.

12. При наличии акушерских осложнений беременная женщина направляется в акушерский стационар

**13. При сочетании осложнений беременности и экстрагенитальной патологии беременная женщина направляется в стационар медицинской организации по профилю заболевания, определяющего тяжесть заболевания.**

14. Для оказания стационарной медицинской помощи беременным женщинам высокой группы риска, проживающим в районах, удаленных от акушерских стационаров, и не имеющим прямых показаний для направления в отделение патологии беременности, но нуждающимся в медицинском наблюдении для предотвращения развития возможных осложнений, беременная женщина направляется по листу маршрутизации в акушерский стационар II Б группы, где развернуты койки акушерского ухода для беременных женщин.

15. Правила организации деятельности отделения (коек) акушерского ухода для беременных женщин, рекомендуемые штатные нормативы и стандарт оснащения отделения акушерского ухода для беременных женщин определены приложениями № 28 - 30 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)»».

16. В дневные стационары направляются женщины в период беременности и в послеродовой период, нуждающиеся в проведении инвазивных манипуляций, ежедневном наблюдении и (или) выполнении медицинских процедур, но не требующие круглосуточного наблюдения и лечения, а также для продолжения наблюдения и лечения после пребывания в круглосуточном стационаре. Рекомендуемая длительность пребывания в дневном стационаре составляет 4-6 часов в сутки.

**17. Показания для оказания первичной медико-санитарной помощи в дневном стационаре:**

- вегетососудистая дистония различного характера и гипертоническая болезнь I и II стадии с подобранной ранее терапией;
- анемия (снижение гемоглобина не ниже 91 г/л);
- ранний токсикоз лёгкой степени при отсутствии или наличии транзиторной кетонурии;
- угроза прерывания беременности в I и II триместрах без ОАА, при отсутствии в анамнезе привычных выкидышей и сохраненной шейке матки, без кровотечений;
- для проведения немедикаментозной терапии (иглорефлексотерапия, физиолечение, психо- и гипнотерапия и др.);
- для проведения неспецифической десенсибилизирующей терапии при наличии резус-отрицательной крови;
- для обследования и лечения беременных с резус-конфликтом в I и II триместрах беременности;
- для оценки состояния плода;
- для обследования при подозрении для обследования и лечения при подозрении на фетоплацентарную недостаточность;
- на порок сердца, патологию мочевыделительной системы и др.;
- в критические сроки беременности при невынашивании в анамнезе без клинических признаков угрозы прерывания;

- при выписке из стационара после наложения швов на шейку матки по поводу истмико-цервикальной недостаточности.

18. В случаях преждевременных родов в 22 недели беременности и более направление женщины осуществляется в ГБУ «Родильный дом».

19. Беременным женщинам с рубцом на матке после одного кесарево сечения при сроке беременности 35-36 недель должен быть составлен план ведения родов: роды через естественные родовые пути, либо плановое оперативное родоразрешение. Если запланировано родоразрешение через естественные родовые пути, беременная женщина направляется на родоразрешение в ГБУ «Родильный дом». Если запланировано родоразрешение путем операции кесарево сечения, то беременная женщина направляется на родоразрешение в акушерский стационар второй А/Б или третьей группы, по показаниям и листу маршрутизации.

20. При сроке беременности 35-36 недель с учетом течения беременности по триместрам, оценки риска осложнений дальнейшего течения беременности и родов на основании результатов всех проведенных исследований, в том числе консультаций врачей-специалистов, врачом-акушером-гинекологом формулируется полный клинический диагноз и определяется место планового родоразрешения. Оформляется Лист маршрутизации для беременной и приклеивается в индивидуальную карту.

21. Беременная женщина и члены ее семьи заблаговременно информируются врачом-акушером-гинекологом о медицинской организации, в которой планируется родоразрешение. Вопрос о необходимости направления в стационар до родов решается индивидуально.

**22. В консультативно-диагностическое отделение ГБУ «Родильный дом» направляются беременные женщины группы высокого риска:**

а) с экстрагенитальными заболеваниями для определения акушерской тактики и дальнейшего наблюдения совместно со специалистами по профилю заболевания, включая рост беременной женщины ниже 150 см, алкоголизм, наркоманию у одного или обоих супругов;

б) с отягощенным акушерским анамнезом (возраст до 18 лет, первобеременные старше 35 лет, невынашивание, бесплодие, случаи перинатальной смерти, рождение детей с высокой и низкой массой тела, рубец на матке, преэклампсия, эклампсия, акушерские кровотечения, операции на матке и придатках, рождение детей с врожденными пороками развития, пузирный занос, прием тератогенных препаратов);

в) с акушерскими осложнениями (ранний токсикоз с метаболическими нарушениями, угроза прерывания беременности, гипертензивные расстройства, анатомически узкий таз, иммунологический конфликт (Rh и АВО изосенсибилизация), анемия, неправильное положение плода, патология плаценты, плацентарные нарушения, многоплодие, многоводие, маловодие, индуцированная беременность, подозрение на внутриутробную инфекцию, наличие опухолевидных образований матки и придатков);

г) с выявленной патологией развития плода для определения акушерской тактики и места родоразрешения.

## **II. Порядок оказания медицинской помощи беременным женщинам с врожденными пороками внутренних органов у плода.**

1. В случае подтверждения врожденного порока развития (далее - ВПР) у плода, требующего хирургической помощи, пренатальный консилиум врачей при ГБУ «Родильный дом», в составе врача-генетика, врача-акушера-гинеколога, врача ультразвуковой диагностики, врача - детского хирурга, врача-кардиолога, врача-сердечно-сосудистого хирурга определяется прогноз для развития плода и жизни новорожденного. Заключение консилиума врачей выдается на руки беременной женщине для предъявления по месту наблюдения по беременности.

2. Лечащий врач представляет беременной женщине информацию о результатах обследования, наличии ВПР у плода и прогнозе для здоровья и жизни новорожденного, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения, на основании чего женщина принимает решение о вынашивании или прерывании беременности.

3. При наличии у плода ВПР, несовместимого с жизнью, или наличии сочетанных пороков с неблагоприятным прогнозом для жизни и здоровья, при ВПР, приводящих к стойкой потере функций организма вследствие тяжести и объема поражения при отсутствии методов эффективного лечения, предоставляется информация о возможности искусственного прерывания беременности по медицинским показаниям.

4. При отказе женщины прервать беременность из-за наличия ВПР или иных сочетанных пороков, несовместимых с жизнью, беременность ведется в соответствии с разделом I настоящего Порядка.

5. При ухудшении состояния плода, а также развитии плацентарных нарушений, беременная женщина направляется в акушерский стационар.

6. При решении вопроса о месте и сроках родоразрешения беременной женщины с сердечно-сосудистым заболеванием у плода, требующим хирургической помощи, консилиум врачей в составе врача-акушера-гинеколога, врача-сердечно-сосудистого хирурга (врача-кардиолога), врача-детского кардиолога (врача-педиатра), врача-педиатра (врача-неонатолога) руководствуется следующими положениями:

6.1. При наличии у плода врожденного порока сердца (далее - ВПС), требующего экстренного хирургического вмешательства после рождения ребенка, беременная женщина направляется для родоразрешения в ФГБУ «ФМИЦ им. В.А. Алмазова» г. Санкт-Петербург.

**К ВПС, требующим экстренного медицинского вмешательства в первые семь дней жизни, относятся:** простая транспозиция магистральных артерий; перерыв дуги аорты; синдром гипоплазии левых отделов сердца; атрезия легочной артерии; синдром гипоплазии правых отделов сердца; предуздальная коарктация аорты; критический стеноз клапана аорты; критический стеноз легочной артерии; сложные ВПС, сопровождающиеся стенозом легочной артерии; тотальный аномальный дренаж легочных вен.

6.2. При наличии у плода ВПС, требующего планового хирургического вмешательства в течение первых 28 дней - трех месяцев жизни ребенка, беременная

женщина направляется для родоразрешения в ГБУ «Родильный дом». После рождения ребенка при подтверждении диагноза и наличии показаний к хирургическому вмешательству, консилиум врачей в составе врача-акушера-гинеколога, врача - сердечно-сосудистого хирурга (врача - детского кардиолога), врача-неонатолога (врача-педиатра) составляет план лечения с указанием сроков оказания медицинского вмешательства новорожденному в кардиохирургическом отделении. Готовится пакет документов на ребенка для направления в ФГБУ «ФМИЦ им. В.А. Алмазова» г. Санкт-Петербург, или в ФГБУ «ФМИЦ ССХ им А.Н. Бакулева» г. Москва, или в ГБУЗ «НИИ ККБ № 1 им. проф. С.В. Очаповского» г. Краснодар.

К ВПС, требующим планового хирургического вмешательства в течение первых 28 дней жизни ребенка, относятся:

- общий артериальный ствол;
- коарктация аорты (внутриутробно) с признаками нарастания градиента на перешейке после рождения (оценка посредством динамического пренатального эхокардиографического контроля);
- умеренный стеноз клапана аорты, легочной артерии с признаками нарастания градиента давления (оценка посредством динамического пренатального эхокардиографического контроля);
- гемодинамически значимый открытый артериальный проток;
- большой дефект аорто-легочной перегородки;
- аномальное отхождение левой коронарной артерии от легочной артерии;
- гемодинамически значимый открытый артериальный проток у недоношенных.

6.3. К ВПС, требующим оперативного вмешательства до трех месяцев жизни, относятся:

- единственный желудочек сердца без стеноза легочной артерии;
- атриовентрикулярная коммуникация, полная форма без стеноза легочной артерии;
- атрезия триkuspidального клапана;
- большие дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок;
- тетрада Фалло;
- двойное отхождение сосудов от правого (левого) желудочка.

6.4. При решении вопроса о месте и сроках родоразрешения беременной женщины с врожденным пороком развития у плода (за исключением ВПС), требующим хирургической помощи, перинатальный консилиум в составе врача-акушера-гинеколога, врача - детского хирурга, врача-генетика и врача ультразвуковой диагностики руководствуется следующими положениями:

6.4.1. При наличии у плода, изолированного ВПР (поражение одного органа или системы) и отсутствии пренатальных данных за возможное сочетание порока с генетическими синдромами или хромосомными аномалиями, беременная женщина направляется для родоразрешения в акушерский стационар ГБУ «Родильный дом», для проведения хирургического вмешательства ребенку после рождения.

Беременные женщины с ВПР у плода данного типа также могут быть

консультированы врачами-специалистами перинатального консилиума врачей (врач-акушер-гинеколог, врач-детский хирург, врач-генетик, врач ультразвуковой диагностики) федеральных медицинских организаций. По результатам консультирования они могут быть направлены на родоразрешение в акушерские стационары федеральных медицинских организаций для оказания помощи новорожденному в условиях отделения хирургии новорожденных, отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.

К изолированным ВПР относятся:

- гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;
- атрезия кишечника (кроме дуоденальной атрезии);
- объемные образования различной локализации;
- пороки развития легких;
- пороки развития мочевой системы без маловодия.

6.5. При наличии у плода ВПР, часто сочетающегося с хромосомными аномалиями или наличии множественных ВПР, в максимально ранние сроки беременности проводится дополнительное обследование с целью определения прогноза для жизни и здоровья плода (консультирование врача-генетика, проведение кариотипирования в декретированные сроки, эхокардиография у плода, магнитно-резонансная томография плода). По результатам проведенного дообследования направляются документы для проведения консультирования врачами-специалистами перинатального консилиума врачей федеральной медицинской организации для решения вопроса о месте родоразрешения беременной женщины.

К ВПР плода, часто сочетающимся с хромосомными аномалиями, или наличием множественных ВПР, относятся:

- омфалоцеле;
- дуоденальная атрезия;
- атрезия пищевода;
- врожденная диафрагмальная грыжа;
- пороки мочевыделительной системы, сопровождающиеся маловодием.

### **III. Порядок оказания медицинской помощи женщинам в период родов и в послеродовой период.**

1. Медицинская помощь женщинам в период родов и в послеродовой период оказывается в рамках специализированной, в том числе высокотехнологичной, и скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по «акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» и (или) «акушерскому делу».

2. Правила организации деятельности родильного дома (отделения; перинатального центра; Центра охраны материнства и детства), рекомендуемые штатные нормативы и стандарт оснащения родильного дома (отделения; перинатального центра; Центра охраны материнства и детства) определены приложениями № 6 – 11, 16 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи

по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)»».

Отсутствие диспансерного наблюдения и обследования во время беременности, либо отсутствие необходимых сопроводительных документов (документ, удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского страхования, обменная карта беременной (форма № 113) и пр.) не является показанием для транспортировки (перевода) пациентки в стационар более высокой группы, за исключением ситуаций, когда на основании клинического и/или лабораторного обследования установлено наличие состояний, служащих основанием для оказания помощи на более высоком уровне.

3. С целью обеспечения оказания доступной и качественной медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде осуществляется на основе листов маршрутизации, позволяющих предоставить дифференцированный объем медицинского обследования и лечения в зависимости от степени риска возникновения осложнений с учетом структуры, коечной мощности, уровня оснащения и обеспеченности квалифицированными кадрами медицинских организаций.

4. В зависимости от коечной мощности, оснащения, кадрового обеспечения медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, разделяются на три группы по возможности оказания медицинской помощи.

а) **Первая группа** - акушерские стационары, в которых не обеспечено круглосуточное пребывание врача-акушера-гинеколога:

- ГБУ «Шатойская ЦРБ»;
- ГБУ «Веденская ЦРБ».

В акушерских стационарах первой группы оказывается медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период низкой степени риска и с доношенным сроком беременности 37 недель и выше.

**Критериями для определения этапности оказания медицинской помощи и направления беременных женщин в акушерские стационары первой группы являются:**

- отсутствие экстрагенитальных заболеваний у беременной женщины или соматическое состояние женщины, не требующее проведения диагностических и лечебных мероприятий по коррекции экстрагенитальных заболеваний;
- отсутствие специфических осложнений гестационного процесса при данной беременности (отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности, родов и в послеродовом периоде, преждевременные роды, задержка внутриутробного роста плода);
- головное предлежание плода при некрупном плоде (до 4 000 г) и нормальных размерах таза матери;
- отсутствие в анамнезе у женщины анте-, интра- и ранней неонатальной смерти;
- отсутствие осложнений при предыдущих родах, таких как гипотоническое кровотечение, глубокие разрывы мягких тканей родовых путей, родовая травма у новорожденного.

**б) Вторая группа** – медицинские организации с круглосуточными дежурствами акушера-гинеколога, анестезиолога-реаниматолога, неонатолога круглосуточно/в дневное время/ургентного и имеющие в своем составе палаты (отделения) реанимации и интенсивной терапии для женщин и палаты интенсивной терапии (далее – ПИТ) для новорожденных.

В акушерских стационарах второй группы оказывается медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период низкой и средней степени риска и с доношенным сроком беременности 37 недель и выше.

В зависимости от наличия врача неонатолога акушерские стационары второй группы подразделены на **А и Б группы**.

**Вторая А группа** - медицинские организации с круглосуточными дежурствами акушера-гинеколога, анестезиолога-реаниматолога, неонатолога в дневное время (или ургентного), имеющие в своем составе палаты (отделения) реанимации и интенсивной терапии для женщин и палаты интенсивной терапии (далее – ПИТ) для новорожденных:

- ГБУ «Шалинская ЦРБ»;
- ГБУ «Аргунская ГБ № 1»;
- ГБУ «Курчалоевская ЦРБ»;
- ГБУ «Ножай-Юртовская ЦРБ»;
- ГБУ «Шелковская ЦРБ»;
- ГБУ «Наурская ЦРБ»;
- ГБУ «Надтеречная ЦРБ»;
- ГБУ «Ачхой-Мартановская ЦРБ».

В акушерских стационарах второй А группы оказывается медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде группы низкого и среднего риска, с доношенным сроком беременности (37 и более недель) из своих районов; в Ачхой-Мартановской ЦРБ - из своего района и Сунженского района.

**Критериями для определения этапности оказания медицинской помощи и направления беременных женщин в акушерские стационары второй А группы являются:**

- пролапс митрального клапана без гемодинамических нарушений;
- компенсированные заболевания дыхательной системы (без дыхательной недостаточности);
- увеличение щитовидной железы без нарушения функции;
- миопия I и II степени без изменений на глазном дне;
- хронический пиелонефрит без нарушения функции;
- инфекции мочевыводящих путей вне обострения;
- заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, дуоденит, колит);
- низкое расположение плаценты, подтвержденное при УЗИ в сроке 34-36 недель;
- мертворождение в анамнезе;
- одно кесарево сечение в анамнезе при отсутствии признаков несостоятельности рубца на матке;

- умеренная преэклампсия.

**Вторая Б группа** – медицинские организации с круглосуточными дежурствами акушера-гинеколога, анестезиолога-реаниматолога, неонатолога и имеющие в своем составе палаты (отделения) реанимации и интенсивной терапии для женщин и палаты интенсивной терапии (далее – ПИТ) для новорожденных.

Акушерские стационары второй Б группы являются кураторами акушерских стационаров второй А группы.

Кураторы оказывают консультативную и практическую помощь, курируемым акушерским стационарам.

Из акушерских стационаров первой А группы, по решению дежурного врача или врачебного консилиума, беременные женщины группы среднего риска могут быть направлены в акушерские стационары 2 Б группы, являющиеся их кураторами.

Ко второй Б группе относятся:

- ГБУ «РКЦОЗМиР им. А. Кадыровой», куда направляются женщины в период беременности, родов и в послеродовом периоде низкого и среднего риска из Грозненского района, среднего риска из Шатойского и Веденского районов, а также является **куратором** Надтеречного, Наурского районов и г. Аргун;

- ГБУ «Гудермесская ЦРБ», куда направляются беременные женщины низкого и среднего риска из своего района, а также является **куратором** Ножай-Юртовского, Курчалоевского районов;

- ГБУ «Урус-Мартановская ЦРБ», куда направляются беременные женщины низкого и среднего риска из своего района, а также является **куратором** Ачхой-Мартановского района, с относящимся к ним Сунженским районом.

- ГБУ «ГКБ № 4 г. Грозного», куда направляются беременные женщины низкого и среднего риска из г. Грозный, а также является **куратором** Шелковского и Шалинского районов.

**Критериями для определения этапности оказания медицинской помощи и направления беременных женщин в акушерские стационары второй Б группы являются состояния, указанные во второй А группе, а также:**

- переношенная беременность;

- предполагаемый крупный плод;

- анатомическое сужение таза I-II степени;

- тазовое предлежание плода;

- поперечное и косое положение плода;

- многоплодная беременность;

- 1 и 2 кесарево сечение в анамнезе;

- 3 и более кесарево сечение в анамнезе - в ГБУ «РКЦОЗМиР им. А. Кадыровой»;

- рубец на матке после консервативной миомэктомии или перфорации матки - при отсутствии признаков несостоятельности рубца на матке;

- беременность после лечения бесплодия любого генеза, беременность после экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбриона;

- многоводие;

- задержка внутриутробного роста плода I степени.

новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания), оказывающий медицинскую помощь беременным высокого риска, а также при всех преждевременных родах в сроке 22-36 недель включительно.

К третьей А группе относится ГБУ «Родильный дом», куда поступают женщины группы высокого риска из всей республики и все случаи преждевременных родов в сроке беременности 22 - 36 недель включительно.

**Критериями для определения этапности оказания медицинской помощи и направления беременных женщин в акушерские стационары третьей А группы являются:**

- преждевременные роды, включая дородовое излитие околоплодных вод, при сроке беременности менее 37 недель, при отсутствии противопоказаний для транспортировки;

- предлежание плаценты, подтвержденное при УЗИ в сроке 34-36 недель;

- тяжелая преэклампсия, эклампсия;

- холестаз, гепатоз беременных;

- кесарево сечение в анамнезе при наличии признаков несостоятельности рубца на матке;

- рубец на матке после консервативной миомэктомии или перфорации матки при наличии признаков несостоятельности рубца;

- беременность после реконструктивно-пластических операций на половых органах, разрывов промежности III-IV степени при предыдущих родах;

- задержка внутриутробного роста плода II-III степени;

- изоиммунизация при беременности;

- наличие у плода врожденных аномалий (пороков развития), требующих хирургической коррекции экстренно после рождения;

- метаболические заболевания плода (требующие лечения сразу после рождения);

- водянка плода;

- тяжелое много- и маловодие;

- заболевания сердечно-сосудистой системы (ревматические и врожденные пороки сердца вне зависимости от степени недостаточности кровообращения, пролапс митрального клапана с гемодинамическими нарушениями, оперированные пороки сердца, аритмии, миокардиты, кардиомиопатии, хроническая артериальная гипертензия);

- тромбозы, тромбоэмболии и тромбофлебиты в анамнезе и при настоящей беременности;

- заболевания органов дыхания, сопровождающиеся развитием легочной или сердечно-легочной недостаточности;

- диффузные заболевания соединительной ткани, антифосфолипидный синдром;

- заболевания почек, сопровождающиеся почечной недостаточностью или артериальной гипертензией, аномалии развития мочевыводящих путей, беременность после нефрэктомии;

- заболевания почек, сопровождающиеся почечной недостаточностью или артериальной гипертензией, аномалии развития мочевыводящих путей, беременность после нефрэктомии;
- заболевания печени (токсический гепатит, острые и хронические гепатиты, цирроз печени);
- эндокринные заболевания (сахарный диабет любой степени компенсации, заболевания щитовидной железы с клиническими признаками гипо- или гиперфункции, хроническая надпочечниковая недостаточность);
- заболевания органов зрения (миопия высокой степени с изменениями на глазном дне, отслойка сетчатки в анамнезе, глаукома);
- заболевания крови (гемолитическая и апластическая анемия, тяжелая железодефицитная анемия, гемобластозы, тромбоцитопения, болезнь Виллебранда, врожденные дефекты свертывающей системы крови);
- заболевания нервной системы (эпилепсия, рассеянный склероз, нарушения мозгового кровообращения, состояния после перенесенных ишемических и геморрагических инсультов);
- миастения;
- злокачественные новообразования в анамнезе либо выявленные при настоящей беременности вне зависимости от локализации;
- сосудистые мальформации, аневризмы сосудов;
- перенесенные в анамнезе черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника, таза;
- прочие состояния, угрожающие жизни беременной женщины, при отсутствии противопоказаний для транспортировки.

г) **Третья Б группа** - акушерские стационары федеральных медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденным, разрабатывающие и тиражирующие новые методы диагностики и лечения акушерской, гинекологической и неонатальной патологии и осуществляющие мониторинг и организационно-методическое обеспечение деятельности акушерских стационаров субъектов Российской Федерации.

**Критериями для определения этапности оказания медицинской помощи и направления беременных женщин в акушерские стационары третьей Б группы являются состояния, указанные в третьей А группе, а также состояния, требующие оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи с применением инновационных технологий.**

## **5. При акушерских осложнениях в сроке до 22 недель беременности:**

Беременные женщины низкого и среднего риска из города Грозный направляются в гинекологические отделения городских больниц г. Грозный; из других районов в свои МО по листу маршрутизации.

В экстренных случаях, а также в нерабочее время, в выходные и праздничные дни в ГБУ «ГКБ № 1 г. Гроздного».

В случае антенатальной смерти плода, женщины направляются в учреждения II Б группы: в сроке до 22 недель в гинекологические отделения, в сроке 22 недель и более в обсервационные отделения акушерских стационаров по листу маршрутизации, и, в соответствии с курацией.

Если женщина относится к низкой или средней группе риска, но ожидаются преждевременные роды в сроке 22 - 36 недель включительно, то в интересах плода, госпитализация проводится в ГБУ «Родильный дом».

Маршрутизации женщин в период беременности и родов при наличии акушерских осложнений проводится по листу маршрутизации согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

**Перечень показаний для госпитализации беременных женщин и родильниц в гинекологическое отделение стационара III группы:**

- угрожающий выкидыш в сроке до 22 недель беременности (беременные женщины с индуцированной беременностью, беременностью после ЭКО, после оперативного лечения бесплодия, с привычным невынашиванием) при наличии профилизированных палат (отделений по лечению угрозы прерывания беременности), в случае отсутствия указанных палат (отделений) женщины госпитализируются в отделения патологии беременности акушерского стационара III группы;

- угрожающий выкидыш до 22 недель беременности (беременные женщины с сопутствующими экстрагенитальными заболеваниями) при наличии профилизированных палат (отделений по лечению угрозы прерывания беременности), в случае отсутствия палат (отделений) женщины госпитализируются в отделения патологии беременности акушерского стационара III группы;

- беременные женщины с сопутствующими экстрагенитальными заболеваниями, имеющие медицинские показания для искусственного прерывания беременности (на основании приказа Минздравсоцразвития от 3 декабря 2007 г. № 736 «Об утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности»);

- осложненный инфицированный и септические аборты;
- осложненные формы послеродовых гнойно-воспалительных заболеваний;
- послеродовые кровотечения;
- доброкачественные опухоли придатков матки;
- доброкачественные опухоли матки.

При экстрагенитальных заболеваниях, требующих стационарного лечения, беременная женщина направляется в профильные отделения медицинских организаций вне зависимости от срока беременности при условии совместного наблюдения и ведения врачом-специалистом по профилю заболевания и врачом-акушером-гинекологом.

Маршрутизация женщин в период беременности и послеродовой период с экстрагенитальными заболеваниями, нуждающихся в лечении в профильном

наблюдения и ведения врачом-специалистом по профилю заболевания и врачом-акушером-гинекологом.

Маршрутизация женщин в период беременности и послеродовой период с экстрагенитальными заболеваниями, нуждающихся в лечении в профильном отделении проводится по листу маршрутизации согласно приложению № 6 к настоящему приказу.

При сочетании осложнений беременности и экстрагенитальной патологии беременная женщина направляется в стационар медицинской организации по профилю заболевания, определяющего тяжесть заболевания.

При риске возникновения осложнений родоразрешения беременные женщины направляются в акушерские стационары второй, третьей А и третьей Б группы в плановом порядке.

6. Направление беременных женщин (рожениц) в акушерские стационары осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами.

7. В акушерских стационарах рекомендуются семейно-ориентированные (партидерские) роды.

8. В процессе родов необходимо ведение партограммы.

9. В течение родов и в первые дни после рождения выполняется комплекс мероприятий, направленных на профилактику гипотермии новорожденных.

10. В родильном зале рекомендуется обеспечить первое прикладывание ребенка к груди не позднее 1,5-2 часов после рождения продолжительностью не менее 30 минут и поддержку грудного вскармливания.

11. В послеродовых отделениях рекомендуется совместное пребывание родильницы и новорожденных, свободный доступ членов семьи к женщине и ребенку.

Рекомендуемое время пребывания родильницы в медицинской организации после физиологических родов - 3 суток.

Перед выпиской родильнице предлагается проведение УЗИ органов малого таза.

12. При выписке родильницы лечащим врачом даются разъяснения о пользе и рекомендуемой продолжительности грудного вскармливания (от 6 месяцев до 2 лет с момента рождения ребенка) и профилактике нежеланной беременности.

13. После выписки из медицинской организации родильница направляется в женскую консультацию по месту жительства для диспансерного наблюдения в послеродовом периоде.

#### **IV. Порядок оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и родильницам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, требующими хирургической помощи.**

1. Беременные женщины с подтвержденными сердечно-сосудистыми заболеваниями, требующими хирургической помощи, в сроке до 10-12 недель беременности обследуются в амбулаторных условиях или при наличии показаний направляются в ГБУ «РКБ им. Ш.Ш. Эпендиева».

Консилиум врачей в составе врача-кардиолога, врача - сердечно-сосудистого хирурга и врача-акушера-гинеколога на основании результатов клинического обследования делает заключение о тяжести состояния женщины и представляет ей

информацию о состоянии ее здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения для решения вопроса о возможности дальнейшего вынашивания беременности.

2. К заболеваниям сердечно-сосудистой системы, требующим консультации и (или) направления в стационар беременных женщин в сроке до 12 недель в ГБУ «РКБ им. Ш.Ш. Эпендиева» для решения вопроса о возможности вынашивания беременности относятся следующие заболевания:

2.1. Ревматические пороки сердца:

- все пороки сердца, сопровождающиеся активностью ревматического процесса;
- все пороки сердца, сопровождающиеся недостаточностью кровообращения;
- ревматические стенозы и недостаточности сердечных клапанов II и более степени тяжести;
- все пороки сердца, сопровождающиеся легочной гипертензией;
- пороки сердца, осложненные бактериальным эндокардитом;
- пороки сердца с нарушениями сердечного ритма;
- пороки сердца с тромбоэмбологическими осложнениями;
- пороки сердца с атриомегалией или кардиомегалией;

2.2. ВПС:

- пороки сердца с большим размером шунта, требующие кардиохирургического лечения;
- пороки сердца с наличием патологического сброса крови (дефект межжелудочковой перегородки, дефект межпредсердной перегородки, открытый артериальный проток);
- пороки сердца, сопровождающиеся недостаточностью кровообращения;
- пороки сердца, сопровождающиеся легочной гипертензией;
- пороки сердца, осложненные бактериальным эндокардитом;
- пороки сердца с затрудненным выбросом крови из правого или левого желудочка (гемодинамически значимые, сопровождающиеся недостаточностью кровообращения и (или) наличием постстенотического расширения);

- врожденные аномалии атрио-вентрикулярных клапанов, сопровождающиеся регургитацией II и более степени и (или) нарушениями сердечного ритма;

- кардиомиопатии;
- тетрада Фалло;
- Болезнь Эбштейна;
- сложные ВПС;
- синдром Эйзенменгера;
- болезнь Аэрза;

2.3. Болезни эндокарда, миокарда и перикарда:

- острые и подострые формы миокардита;
- хронический миокардит, миокардиосклероз и миокардиодистрофия, сопровождающиеся недостаточностью кровообращения и (или) сложными нарушениями сердечного ритма;

- инфаркт миокарда в анамнезе;
  - острые и подострые формы бактериального эндокардита;
  - острые и подострые формы перикардита;
- 2.4. Нарушения ритма сердца (сложные формы нарушения сердечного ритма);  
2.5. Состояния после операций на сердце.

3. При наличии медицинских показаний для прерывания беременности и согласия женщины искусственное прерывание беременности по медицинским показаниям при сроке до 22 недель беременности проводится в условиях гинекологического отделения ГБУ «РКБ им. Ш.Ш. Эпендиева», имеющей возможность оказания специализированной (в том числе кардиореанимационной) медицинской помощи женщине.

При отказе женщины прервать беременность консилиум врачей в составе врача-кардиолога (врача - сердечно-сосудистого хирурга) и врача-акушера-гинеколога решает вопрос о дальнейшей тактике ведения беременности, а в случае необходимости (наличие тромбоза протеза, критических стенозов и недостаточности клапанов сердца, требующих протезирования, нарушение сердечного ритма, требующих радиочастотной абляции) - о направлении в ФГБУ «ФМИЦ им В.А. Алмазова» г. Санкт-Петербург.

При сроке беременности 18 - 22 недели женщины с сердечно-сосудистыми заболеваниями, требующими хирургической помощи, обследуются амбулаторно или стационарно (по показаниям) в ГБУ «РКБ им. Ш.Ш. Эпендиева» или направляется в федеральную медицинскую организацию (имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по «кардиологии» и/или «сердечно-сосудистой хирургии» и «акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», для уточнения функционального состояния сердечно-сосудистой системы, подбора (коррекции) медикаментозной терапии,пренатальной диагностики с целью исключения врожденных аномалий (пороков развития) плода, проведения УЗИ и допплерометрии для оценки состояния фетоплацентарного комплекса.

4. При сроке беременности 27-32 недели беременные женщины с сердечно-сосудистыми заболеваниями, требующими хирургической помощи, направляются в кардиологическое отделение ГБУ «РКБ им. Ш.Ш. Эпендиева» или в федеральную медицинскую организацию (имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по «кардиологии» и (или) «сердечно-сосудистой хирургии», «акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)»), для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы, проведения УЗИ и допплерометрии, подбора (коррекции) медикаментозной терапии, оценки состояния фетоплацентарного комплекса, определения предполагаемых сроков родоразрешения.

Консилиум врачей медицинской организации, в стационаре которой направлена беременная женщина, в составе врача - сердечно-сосудистого хирурга, врача-кардиолога и врача-акушера-гинеколога на основании осмотра, результатов обследования (электрокардиографии и эхокардиографии, УЗИ с допплерометрией)

составляет заключение о тяжести состояния женщины и делает заключение о дальнейшей тактике ведения беременности, а при наличии противопоказаний - о досрочном родоразрешении по медицинским показаниям.

5. При сроке беременности 35 - 37 недель женщины направляются в ГБУ «Родильный дом» на пренатальный консилиум (для уточнения сроков родов, выбора способа родоразрешения). Медицинская организация для родоразрешения, способ и сроки родоразрешения определяются консилиумом врачей в составе врача-кардиолога (врача-сердечно-сосудистого хирурга), врача-акушера-гинеколога и врача-анестезиолога-реаниматолога в соответствии с функциональным классом по сердечной недостаточности и динамической оценкой, а также течением беременности и особенностями состояния фетоплацентарного комплекса.

Функциональный класс по сердечной недостаточности уточняется непосредственно перед родами с внесением необходимых корректив в план ведения беременности, сроки и способы родоразрешения.

6. Беременные женщины с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нуждающиеся в хирургической помощи, при наличии высокого риска развития критических состояний, связанных с кардиохирургической патологией (тромбоз протеза, критические стенозы и недостаточность клапанов сердца, требующие протезирования; нарушения сердечного ритма, требующие радиочастотной абляции) и нуждающиеся в экстренной кардиохирургической помощи, направляются для родоразрешения в ФГБУ «ФМИЦ им В.А. Алмазова» г. Санкт-Петербург для проведения соответствующего лечения.

7. Дальнейшая тактика ведения родильниц определяется консилиумом врачей в составе врача-акушера-гинеколога, врача-кардиолога (врача-сердечно-сосудистого хирурга по показаниям), врача-анестезиолога-реаниматолога. При наличии показаний к кардиохирургической коррекции медицинское вмешательство проводится в условиях отделения сердечнососудистой хирургии. Для дальнейшего лечения и реабилитации родильница переводится в кардиологическое отделение. При отсутствии показаний к хирургическому лечению пациентка переводится в акушерский стационар.

## **V. Порядок оказания медицинской помощи женщинам при неотложных состояниях в период беременности, родов и в послеродовой период.**

1. Качественная медицинская помощь пациенткам акушерского профиля требует организации медицинской эвакуации беременных женщин, рожениц и родильниц в учреждения родовспоможения III группы – родильные дома, перинатальные центры, и/или в многопрофильные ЛПУ для проведения комплексного лечения и интенсивной терапии.

Современные возможности проведения интенсивной терапии значительно сузили критерии нетранспортабельности и чрезвычайно важно соблюдать основные принципы медицинской эвакуации беременных женщин, рожениц, родильниц группы высокого риска. Медицинская эвакуация беременных женщин группы риска и родильниц осуществляется только санитарным медицинским транспортом ( наземным или авиа) в зависимости от тяжести состояния пациентки

и расстояния, в сопровождении медицинского персонала. Стандарт оснащения санитарного транспорта и выездной бригады должен соответствовать ГОСТам, регламентирующим оснащение санитарного транспорта класса С, и требованиям, утвержденным приказами Минздрава Росси от 20 июня 2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи».

Транспортировке (переводу) подлежат пациентки, находящиеся на стационарном лечении в учреждениях более низкой группы оказания медицинской помощи в случае присоединения тех либо иных осложнений, либо экстренно поступившие в стационар более низкой степени риска и при установлении на момент госпитализации критериев, требующих перевода в отделение более высокого уровня оказания медицинской помощи.

О переводе пациентки в конкретное учреждение более высокой группы информируется по телефону администрация (заместитель главного врача, заведующий отделением) данного учреждения в рабочее время, а в ночное в выходные и праздничные дни - дежурный врачебный персонал.

Перевод осуществляется только в сопровождении подготовленного медицинского работника: фельдшера, акушерки, врача акушера - гинеколога, врача анестезиолога - реаниматолога, что определяется характером и тяжестью основного состояния.

Во время транспортировки обязательно проведение контроля за состоянием пациентки, включая оценку основных клинических показателей, и продолжение начатого при подготовке к транспортировке лечения (токолитическая, противосудорожная терапия и др.).

Данные о состоянии пациентки на этапе подготовки и во время транспортировки заносятся в Карту транспортировки согласно приложению № 9 к данному приказу.

Критические состояния у пациенток акушерского профиля требуют обязательной медицинской эвакуации в родильный дом, перинатальный центр и многопрофильные МО, имеющие в своем составе отделения анестезиологии и реанимации.

2. К основным состояниям и заболеваниям, требующим проведения мероприятий по реанимации и интенсивной терапии женщин в период беременности, родов и в послеродовой период, относятся:

- острые расстройства гемодинамики различной этиологии (острая сердечно-сосудистая недостаточность, гиповолемический шок, септический шок, кардиогенный шок, травматический шок);
- преэклампсия;
- HELLP-синдром;
- острый жировой гепатоз беременных;
- ДВС-синдром;
- послеродовой сепсис;
- сепсис во время беременности любой этиологии;
- ятрогенные осложнения (осложнения анестезии, трансфузационные осложнения и так далее);

- пороки сердца с нарушением кровообращения I степени, легочной гипертензией или другими проявлениями декомпенсации;
- миокардиодистрофия, кардиомиопатия с нарушениями ритма или недостаточностью кровообращения;
- сахарный диабет с груднокорригируемым уровнем сахара в крови и склонностью к кетоацидозу;
- тяжелая анемия любого генеза;
- тромбоцитопения любого происхождения;
- острые нарушения мозгового кровообращения, кровоизлияния в мозг;
- тяжелая форма эпилепсии;
- миастения;
- острые расстройства дыхания, острые расстройства функций жизненно важных органов и систем (центральной нервной системы, паренхиматозных органов), острые нарушения обменных процессов.

Транспортабельность данной категории пациенток зависит от конкретной клинической ситуации, оценивается и осуществляется только врачом анестезиологом-реаниматологом. Начатая на месте интенсивная терапия продолжается во время транспортировки.

3. При определении нетранспортабельности пациентки акушерского профиля необходимо обеспечить адекватный уровень оказания помощи на месте - консультация смежных специалистов, оперативные вмешательства, протезирование жизненно важных функций (ИВЛ, диализ и т.д.).

К абсолютным противопоказаниям к медицинской эвакуации можно отнести:

- агональное состояние пациентки;
- несостоятельность хирургического гемостаза до ее устранения;
- отек головного мозга с комой III (или оценкой по шкале ком Глазко менее 7 баллов);
  - отек головного мозга с прогрессированием дислокационного синдрома;
  - прогрессирующая отслойка плаценты;
  - рефрактерный шок любого генеза;
  - рефрактерная к ИВЛ декомпенсированная дыхательная недостаточность при невозможности обеспечения ЭКМО (экстракорпоральная мембранные оксигенация);
  - острые дислокационные синдромы в грудной клетке до возможности их разрешения;
  - эклампсия (судорожный приступ);
  - наличие установленного недренированного гнойного очага с предикторами/течением септического шока при возможности санации на месте;
  - неэффективность токолиза при преждевременных родах;
  - высокая вероятность родов во время транспортировки.

4. Для организации медицинской помощи, требующей интенсивного лечения и проведения реанимационных мероприятий, в акушерских стационарах создаются отделения анестезиологии-реаниматологии, а также дистанционный акушерский консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской

помощи (далее - дистанционный акушерский консультативный центр - ДАКЦ).

ДАКЦ работает в соответствии с Положением, которое регулирует вопросы организации деятельности дистанционного акушерского консультативного центра с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи родильного дома согласно приложению № 7 к данному приказу.

5. В отделение анестезиологии-реаниматологии направляются беременные женщины, роженицы и родильницы с острыми расстройствами гемодинамики различной этиологии (острая сердечно-сосудистая недостаточность, гиповолемический шок, септический шок, кардиогенный шок, травматический шок), пре- и эклампсией, ДВС-синдромом, острыми расстройствами дыхания, другими острыми расстройствами функций жизненно важных органов и систем (центральной нервной системы, паренхиматозных органов), острыми нарушениями обменных процессов, родильницы в восстановительном периоде после оперативного родоразрешения, осложненного нарушениями функций жизненно важных органов или при реальной угрозе их развития.

В случае необходимости к оказанию медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и родильницам в отделение анестезиологии-реаниматологии должны привлекаться врачи той специальности, к которой относится заболевание, определившее необходимость в проведении реанимации и интенсивной терапии.

Основанием для перевода родильниц в послеродовое отделение, беременных женщин - в отделение патологии беременности (другие профильные отделения по показаниям) для дальнейшего наблюдения и лечения является стойкое восстановление гемодинамики и спонтанного дыхания, коррекция метаболических нарушений и стабилизация жизненно важных функций.

6. Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи, включая мероприятия по реанимации и интенсивной терапии, женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период осуществляется в два этапа:

вне медицинской организации - осуществляется выездной анестезиолого-реанимационной акушерской бригадой ДАКЦ;

в стационарных условиях - осуществляется в отделениях анестезиологии-реаниматологии медицинских организаций.

7. При возникновении клинической ситуации, угрожающей жизни беременной женщины, роженице или родильнице на уровне фельдшерско-акушерского пункта медицинский работник в экстренном порядке вызывает бригаду СМП и информирует администрацию соответствующей районной больницы о сложившейся ситуации.

Дежурный администратор районной больницы организует консультативную помощь медицинскому работнику, оказывающему медицинскую помощь беременной женщине, роженице или родильнице с привлечением врачей-акушеров-гинекологов и врачей-анестезиологов-реаниматологов до времени прибытия бригады СМП и осуществляет подготовку подразделений медицинской организации к приему беременной женщины, роженицы или родильницы.

8. При поступлении беременной женщины, роженицы или родильницы в

медицинскую организацию, после оценки тяжести состояния беременной женщины, роженицы или родильницы и установления предварительного диагноза, врач, оказывающий ей медицинскую помощь, сообщает о ситуации заместителю главного врача, курирующему службу родовспоможения, и в дистанционный акушерский консультативный центр для согласования объема медицинской помощи и вызова выездной анестезиолого-реанимационной акушерской бригады для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи.

9. Выездная анестезиолого-реанимационная акушерская бригада для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи направляется для оказания специализированной анестезиолого-реанимационной помощи беременным женщинам, роженицам и родильницам с тяжелой акушерской и экстрагенитальной патологией, находящимся на лечении в акушерских стационарах первой и второй групп, для оказания медицинской помощи на месте, а также для транспортировки женщин, нуждающихся в интенсивной терапии в период беременности, родов и в послеродовой период, в акушерские стационары третьей А и Б группы.

10. Выездная анестезиолого-реанимационная акушерская бригада для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи транспортирует женщин с акушерской патологией в отделения анестезиологии-реаниматологии акушерских стационаров, с экстрагенитальными заболеваниями в отделения анестезиологии-реаниматологии в составе многопрофильных медицинских организаций по профилю заболевания, в которых обеспечено круглосуточное специализированное лечение этой категории пациентов.

11. При медицинской эвакуации ЛПУ, которое отправляет «от себя» и бригада, которая будет осуществлять транспортировку должны определить, к какой группе можно отнести пациентку и обеспечить максимальную безопасность.

Группы пациенток и условия медицинской эвакуации

Группа пациенток	Причина межгоспитальной транспортировки	Мероприятия
Группа А	Регламентирующие нормативные правовые акты	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Любой санитарный транспорт. Автомобили класса А и В.</li> <li>- Не требуется предтранспортная подготовка, мониторинг жизненно важных функций организма и проведение лекарственной терапии.</li> <li>- Достаточный уровень сопровождения – фельдшерская или врачебная общепрофильная выездная бригада скорой медицинской помощи</li> </ul>
Группа Б	Нормативные правовые акты, регламентирующие проведение мероприятий по реанимации и интенсивной	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Специализированная выездная бригада скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации. Автомобиль класса С.</li> <li>- Требуется транспортная подготовка.</li> <li>- Обязательный мониторинг: АД, ЧСС, пульсоксиметрия, ЧСС плода.</li> </ul>

	терапии женщин в период беременности, родов и послеродовой период.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- При необходимости ЭКГ, капнометрия, температура тела, диурез.</li> <li>- Должна быть возможность проведения ИВЛ и микроструйного введения препаратов, инфузионной терапии, обезболивания и седации.</li> <li>- Обязательное сопровождение: врач анестезиолог-реаниматолог, врач акушер-гинеколог.</li> </ul>
Группа В	Развитие угрожающего жизни состояния (остановка сердца, аритмия, ТЭЛА, кровотечение, эклампсия, кома, травма и т.д.) в амбулаторных условиях или вне лечебного учреждения. Отказ от транспортировки в ЛПУ – только констатация смерти.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Любой санитарный транспорт. Главная цель – максимально быстрая доставка в ближайшее ЛПУ (хирургический стационар, роддом).</li> <li>- При необходимости – проведение сердечно – легочной реанимации во время транспортировки. Родоразрешение может быть проведено в любом ЛПУ.</li> <li>- Максимально быстрое консультирование из ЛПУ III группы и обеспечение необходимого уровня медицинской помощи на месте.</li> <li>- Уровень сопровождения – все медицинские работники. При необходимости дальнейшей перегоспитализации – как пациенток группы Б</li> </ul>

В процессе медицинской эвакуации необходима готовность к выявлению и устранению возможных осложнений:

- гемодинамическая нестабильность: гипотензия, гипертензия, жизнеугрожающие нарушения ритма сердца, асистолия;
- респираторная нестабильность: прогрессирующая гипоксемия, бронхоспазм, пневмоторакс, непреднамеренная экстубация, десинхронизация с аппаратом ИВЛ;
- неврологическая нестабильность: возбуждение, ажиотация, прогрессирующие угнетения сознания и внутричерепной гипертензии;
- наведенная гипотермия;
- отказ медицинского оборудования;
- «человеческий фактор».

## **VI. Порядок оказания медицинской помощи женщинам с ВИЧ-инфекцией в период беременности, родов и в послеродовой период.**

1. Оказание медицинской помощи женщинам с ВИЧ-инфекцией в период беременности, родов и в послеродовом периоде осуществляется в соответствии с разделами I и III Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 572н.

2. Лабораторное обследование беременных женщин на наличие в крови антител к вирусу иммунодефицита человека (далее - ВИЧ) проводится при постановке на учет по беременности.

3. При отрицательном результате первого обследования на антитела к ВИЧ, женщинам, планирующим сохранить беременность, проводят повторное тестирование в 28-30 недель. Женщин, которые во время беременности употребляли парентерально психоактивные вещества и (или) вступали в половые контакты с ВИЧ-инфицированным партнером, рекомендуется обследовать дополнительно на 36 неделе беременности.

4. Молекулярно-биологическое обследование беременных на ДНК или РНК ВИЧ проводится:

а) при получении сомнительных результатов тестирования на антитела к ВИЧ, полученных стандартными методами (иммуноферментный анализ (далее - ИФА) и иммунный блок);

б) при получении отрицательных результатов теста на антитела к ВИЧ, полученных стандартными методами в случае, если беременная женщина относится к группе высокого риска по ВИЧ-инфекции (употребление наркотиков внутривенно, незащищенные половые контакты с ВИЧ-инфицированным партнером в течение последних 6 месяцев).

5. Забор крови при тестировании на антитела к ВИЧ осуществляется в процедурном кабинете женской консультации с помощью вакуумных систем для забора крови с последующей передачей крови в лабораторию медицинской организации с направлением.

6. Тестирование на антитела к ВИЧ сопровождается обязательным дотестовым и послетестовым консультированием.

Послетестовое консультирование проводится беременным женщинам независимо от результата тестирования на антитела к ВИЧ и включает обсуждение следующих вопросов: значение полученного результата с учетом риска заражения ВИЧ-инфекцией; рекомендации по дальнейшей тактике тестирования; пути передачи и способы защиты от заражения ВИЧ-инфекцией; риск передачи ВИЧ-инфекции во время беременности, родов и грудного вскармливания; методы профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, доступные для беременной женщины с ВИЧ-инфекцией; возможность проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ ребенку; возможные исходы беременности; необходимость последующего наблюдения матери и ребенка; возможность информирования о результатах теста полового партнера и родственников.

7. Беременных женщин с положительным результатом лабораторного обследования на антитела к ВИЧ, врач-акушер-гинеколог, а в случае его отсутствия - врач общей практики (семейный врач), медицинский работник фельдшерско-акушерского пункта, направляет в ГБУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» для дополнительного обследования, постановки на диспансерный учет и назначения химиопрофилактики перинатальной трансмиссии ВИЧ (антиретровирусной терапии).

Информация, полученная медицинскими работниками о положительном результате тестирования на ВИЧ-инфекцию беременной женщины, роженицы, родильницы, проведении антиретровирусной профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, совместном наблюдении женщины со специалистами ГБУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД»,

перинатальном контакте ВИЧ-инфекции у новорожденного, не подлежит разглашению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8. Дальнейшее наблюдение беременной женщины с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции осуществляется совместно врачом-инфекционистом ГБУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» и врачом-акушером-гинекологом женской консультации по месту жительства.

При невозможности направления (наблюдения) беременной женщины в ГБУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» наблюдение осуществляет врач-акушер-гинеколог по месту жительства при методическом и консультативном сопровождении врача-инфекциониста ГБУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД».

Врач-акушер-гинеколог женской консультации в период наблюдения за беременной женщиной с ВИЧ-инфекцией направляет в ГБУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» информацию о течении беременности, сопутствующих заболеваниях, осложнениях беременности, результатах лабораторных исследований для корректировки схем антиретровирусной профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку и (или) антиретровирусной терапии и запрашивает из ГБУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» информацию об особенностях течения ВИЧ-инфекции у беременной женщины, режиме приема антиретровирусных препаратов, согласовывает необходимые методы диагностики и лечения с учетом состояния здоровья женщины и течения беременности.

9. В течение всего периода наблюдения беременной женщины с ВИЧ-инфекцией врач-акушер-гинеколог женской консультации в условиях строгой конфиденциальности (с использованием кода) отмечает в медицинской документации женщины ее ВИЧ-статус, наличие (отсутствие) и прием (отказ от приема) антиретровирусных препаратов, необходимых для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, назначенных специалистами ГБУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД».

Об отсутствии у беременной женщины антиретровирусных препаратов, отказе от их приема, врач-акушер-гинеколог женской консультации незамедлительно информирует ГБУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» для принятия соответствующих мер.

10. В период диспансерного наблюдения за беременной женщиной с ВИЧ-инфекцией рекомендуется избегать процедур, повышающих риск инфицирования плода (амниоцентез, биопсия хориона). Рекомендуется использование неинвазивных методов оценки состояния плода.

11. При поступлении на роды в акушерский стационар необследованных на ВИЧ-инфекцию женщин, женщин без медицинской документации или с однократным обследованием на ВИЧ-инфекцию, а также употреблявших в течение беременности психоактивные вещества внутривенно, или имевших незащищенные половые контакты с ВИЧ-инфекцированным партнером, рекомендуется лабораторное обследование экспресс-методом на антитела к ВИЧ после получения информированного добровольного согласия.

12. Тестирование роженицы на антитела к ВИЧ в акушерском стационаре сопровождается дотестовым и послетестовым консультированием, включающим информацию о значении тестирования, методах профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку (применение антиретровирусных препаратов, способе родоразрешения, особенностях вскармливания новорожденного (после рождения ребенок не прикладывается к груди и не вскармливается материнским молоком, а переводится на искусственное вскармливание).

13. Обследование на антитела к ВИЧ с использованием диагностических экспресс-тест-систем, разрешенных к применению, проводится в лаборатории или приемном отделении акушерского стационара медицинскими работниками, прошедшими специальную подготовку.

Исследование проводится в соответствии с инструкцией, прилагаемой к конкретному экспресс-тесту.

Часть образца крови, взятого для проведения экспресс-теста, направляется для проведения обследования на антитела к ВИЧ по стандартной методике (ИФА, при необходимости иммунный блок) в скрининговой лаборатории. Результаты этого исследования немедленно передаются в медицинскую организацию.

14. Каждое исследование на ВИЧ с применением экспресс тестов должно сопровождаться обязательным параллельным исследованием той же порции крови классическими методами (ИФА, иммунный блок).

При получении положительного результата оставшаяся часть сыворотки или плазмы крови направляется в лабораторию ГБУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» для проведения верификационного исследования, результаты которого немедленно передаются в акушерский стационар.

15. В случае получения положительного результата тестирования на ВИЧ в лаборатории ГБУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» женщина с новорожденным после выписки из акушерского стационара направляется в ГБУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» для консультирования и дальнейшего обследования.

16. В экстренных ситуациях, при невозможности ожидания результатов стандартного тестирования на ВИЧ-инфекцию из ГБУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» для решения о проведении профилактического курса антиретровирусной терапии передачи ВИЧ от матери ребенку принимается при обнаружении антител к ВИЧ с помощью экспресс-тест-систем. Положительный результат экспресс-теста является основанием только для назначения антиретровирусной профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, но не для постановки диагноза ВИЧ-инфекции.

17. Для обеспечения профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку в акушерском стационаре постоянно должен иметься необходимый запас антиретровирусных препаратов.

18. Проведение антиретровирусной профилактики у женщины в период родов осуществляют врач-акушер-гинеколог, ведущий роды, в соответствии с рекомендациями и стандартами по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку.

19. Профилактический курс антиретровирусной терапии во время родов в акушерском стационаре проводится:

- а) у роженицы с ВИЧ-инфекцией;
- б) при положительном результате экспресс-тестирования женщины в родах;
- в) при наличии эпидемиологических показаний:
  - невозможность проведения экспресс-тестирования или своевременного получения результатов стандартного теста на антитела к ВИЧ у роженицы,
  - наличие в анамнезе у роженицы в период настоящей беременности парентерального употребления психоактивных веществ или полового контакта с партнером с ВИЧ-инфекцией,
  - при отрицательном результате обследования на ВИЧ-инфекцию, если с момента последнего парентерального употребления психоактивных веществ или полового контакта с ВИЧ-инфицированным партнером прошло менее 12 недель.

20. Врачом-акушером-гинекологом принимаются меры по недопущению длительности безводного промежутка более 4 часов.

21. При ведении родов через естественные родовые пути проводится обработка влагалища 0,25% водным раствором хлоргексидина при поступлении на роды (при первом влагалищном исследовании), а при наличии кольпита - при каждом последующем влагалищном исследовании. При безводном промежутке более 4 часов обработку влагалища хлоргексидином проводят каждые 2 часа.

22. Во время ведения родов у женщины с ВИЧ-инфекцией при живом плоде рекомендуется ограничить проведение процедур, повышающих риск инфицирования плода: родостимуляция; родоусиление; перинео(эпизио)томия; амниотомия; наложение акушерских щипцов; вакуум-экстракция плода. Выполнение данных манипуляций производится только по жизненным показаниям.

23. Плановое кесарево сечение для профилактики интранатального заражения ребенка ВИЧ-инфекцией проводится (при отсутствии противопоказаний) до начала родовой деятельности и излития околоплодных вод при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- а) концентрация ВИЧ в крови матери (вирусная нагрузка) перед родами (на сроке не ранее 32 недели беременности) более или равна 1 000 коп/мл;
- б) вирусная нагрузка матери перед родами неизвестна;
- в) антиретровирусная химиопрофилактика не проводилась во время беременности (или проводилась в режиме монотерапии или ее продолжительность была менее 4 недель) или невозможно применить антиретровирусные препараты в родах.

24. При невозможности проведения химиопрофилактики в родах кесарево сечение может быть самостоятельной профилактической процедурой, снижающей риск заражения ребенка ВИЧ-инфекцией в период родов, при этом его проводить не рекомендуется при безводном промежутке более 4 часов.

25. Окончательное решение о способе родоразрешения женщины с ВИЧ-инфекцией принимается врачом-акушером-гинекологом, ведущим роды, в индивидуальном порядке, с учетом состояния матери и плода, сопоставляя в конкретной ситуации пользу от снижения риска заражения ребенка при проведении

операции кесарева сечения с вероятностью возникновения послеоперационных осложнений и особенностей течения ВИЧ-инфекции.

26. У новорожденного от ВИЧ-инфицированной матери сразу после рождения осуществляется забор крови для тестирования на антитела к ВИЧ с помощью вакуумных систем для забора крови. Кровь направляется в лабораторию ГБУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД».

27. Антиретровирусная профилактика новорожденному назначается и проводится врачом-неонатологом или врачом-педиатром независимо от приема (отказа) антиретровирусных препаратов матерью в период беременности и родов.

28. Показаниями к назначению антиретровирусной профилактики новорожденному, рожденному от матери с ВИЧ-инфекцией, положительным результатом экспресс-тестирования на антитела к ВИЧ в родах, неизвестным ВИЧ-статусом в акушерском стационаре являются:

а) возраст новорожденного не более 72 часов (3 суток) жизни при отсутствии вскармливания материнским молоком;

б) при наличии вскармливания материнским молоком (вне зависимости от его продолжительности) - период не более 72 часов (3 суток) с момента последнего вскармливания материнским молоком (при условии его последующей отмены);

в) эпидемиологические показания:

- неизвестный ВИЧ статус матери, употребляющей парентерально психоактивные вещества или имеющей половой контакт с ВИЧ-инфицированным партнером,

- отрицательный результат обследования матери на ВИЧ-инфекцию, употребляющей парентерально в течение последних 12 недель психоактивные вещества или имеющей половой контакт с партнером с ВИЧ-инфекцией.

29. Новорожденному проводится гигиеническая ванна с раствором хлоргексидина (50 мл 0,25 % раствора хлоргексидина на 10 литров воды). При невозможности использовать хлоргексидин используется мыльный раствор.

30. При выписке из акушерского стационара врач-неонатолог или врач-педиатр подробно в доступной форме разъясняет матери или лицам, которые будут осуществлять уход за новорожденным, дальнейшую схему приема химиопрепаратов ребенком, выдает на руки антиретровирусные препараты для продолжения антиретровирусной профилактики в соответствии с рекомендациями и стандартами.

При проведении профилактического курса антиретровирусных препаратов методами экстренной профилактики, выписка из родильного дома матери и ребенка осуществляется после окончания профилактического курса, то есть не ранее 7 дней после родов.

В акушерском стационаре проводится консультирование женщин с ВИЧ по вопросу отказа от грудного вскармливания, при согласии женщины принимаются меры к прекращению лактации.

31. Данные о ребенке, рожденном матерью с ВИЧ-инфекцией, проведении антиретровирусной профилактики женщине в родах и новорожденному, способах родоразрешения и вскармливания новорожденного указываются (с кодом контингента) в медицинской документации матери и ребенка и передаются в ГБУ

«Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД», а также в детскую поликлинику, в которой будет наблюдаваться ребенок.

## **VII. Порядок оказания медицинской помощи женщинам с гинекологическими заболеваниями.**

1. Медицинская помощь при гинекологических заболеваниях оказывается в рамках первичной медико-санитарной, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по «акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» и (или) «акушерскому делу».

Правила организации деятельности гинекологического отделения медицинской организации, рекомендуемые штатные нормативы и стандарт оснащения гинекологического отделения медицинской организации определены приложениями № 17 - 19 к Порядку оказания акушерско-гинекологической помощи, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 572н.

2. Этапность оказания медицинской помощи женщинам с гинекологическими заболеваниями определена приложением № 20 к Порядку оказания акушерско-гинекологической помощи, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 572н.

3. Основной задачей первичной медико-санитарной помощи гинекологическим больным является профилактика, раннее выявление и лечение наиболее распространенных гинекологических заболеваний, а также оказание медицинской помощи при неотложных состояниях, санитарно-гигиеническое образование, направленное на предупреждение абортов, охрану репродуктивного здоровья, формирование стереотипа здорового образа жизни, с использованием эффективных информационно-просветительских моделей (школы пациентов, круглые столы с участием пациентов, дни здоровья).

На этапе первичной медико-санитарной помощи врач-акушер-гинеколог взаимодействует со специалистом по социальной работе в части осуществления мероприятий по предупреждению абортов, проведения консультаций по вопросам социальной защиты женщин, обращающихся по поводу прерывания нежеланной беременности, формирования у женщины сознания необходимости вынашивания беременности и дальнейшей поддержки в период беременности и после родов.

В рамках первичной медико-санитарной помощи осуществляются профилактические медицинские осмотры женщин, направленные на раннее выявление гинекологических заболеваний, патологии молочных желез, инфекций, передаваемых половым путем, ВИЧ-инфекции, подбор методов контрацепции, преконцепционную и прегравидарную подготовку.

При проведении профилактических осмотров женщин осуществляются цитологический скрининг на наличие атипических клеток шейки матки, маммография, УЗИ органов малого таза.

4. По результатам профилактических осмотров женщин формируются группы состояния здоровья:

- I группа - практически здоровые женщины, не нуждающиеся в диспансерном наблюдении;
- II группа - женщины с риском возникновения патологии репродуктивной системы;
- III группа - женщины, нуждающиеся в дополнительном обследовании в амбулаторных условиях для уточнения (установления) диагноза при впервые установленном хроническом заболевании или при наличии уже имеющегося хронического заболевания, а также нуждающиеся в лечении в амбулаторных условиях;
- IV группа - женщины, нуждающиеся в дополнительном обследовании и лечении в условиях стационара;
- V группа - женщины с впервые выявленными заболеваниями или наблюдающиеся по хроническому заболеванию и имеющие показания для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Женщинам, отнесенными к I и II группам состояния здоровья, рекомендуются профилактические осмотры не реже 1 раза в год.

При наличии риска возникновения патологии репродуктивной системы в детородном возрасте женщины ориентируются врачом-акушером-гинекологом на деторождение с последующим подбором методов контрацепции.

Женщинам, отнесенными к III, IV, V группам состояния здоровья, в зависимости от выявленных заболеваний составляется индивидуальная программа лечения, при необходимости за ними устанавливается диспансерное наблюдение врачом-акушером-гинекологом по месту жительства.

#### **Группы диспансерного наблюдения:**

1 диспансерная группа - женщины с хроническими заболеваниями, доброкачественными опухолями и гиперпластическими процессами репродуктивной системы и молочной железы, фоновыми заболеваниями шейки матки;

2 диспансерная группа - женщины с врожденными аномалиями развития и положения гениталий;

3 диспансерная группа - женщины с нарушениями функции репродуктивной системы (невынашивание, бесплодие).

Женщины с хроническими заболеваниями, доброкачественными опухолями и гиперпластическими процессами репродуктивной системы обследуются на предмет исключения злокачественных новообразований.

Медицинская помощь женщинам с целью выявления заболеваний молочных желез оказывается врачом-акушером-гинекологом, прошедшим тематическое усовершенствование по патологии молочной железы.

Женщины с выявленными кистозными и узловыми изменениями молочных желез направляются в онкологический диспансер для верификации диагноза. После исключения злокачественных новообразований женщины с доброкачественными заболеваниями молочных желез находятся под диспансерным наблюдением врача-акушера-гинеколога, который оказывает медицинскую помощь по диагностике доброкачественной патологии молочных

желез и лечению доброкачественных диффузных изменений с учетом сопутствующей гинекологической патологии.

5. В дневные стационары направляются женщины с гинекологическими заболеваниями, нуждающиеся в проведении инвазивных манипуляций, ежедневном наблюдении и (или) выполнении медицинских процедур, но не требующие круглосуточного наблюдения и лечения, а также для продолжения наблюдения и лечения после пребывания в круглосуточном стационаре. Рекомендуемая длительность пребывания в дневном стационаре составляет 4-6 часов в сутки.

При наличии показаний для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи женщины с гинекологической патологией направляются в медицинские организации, имеющие лицензии и врачей-специалистов соответствующего профиля.

### **VIII. Порядок оказания медицинской помощи девочкам с гинекологическими заболеваниями.**

1. Оказание медицинской помощи девочкам (в возрасте до 17 лет включительно) с гинекологическими заболеваниями осуществляется в рамках первичной медико-санитарной, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

2. Первая медико-санитарная помощь девочкам включает:

а) профилактику нарушений формирования репродуктивной системы и заболеваний половых органов;

б) раннее выявление, лечение, в том числе неотложное, и проведение медицинских реабилитационных мероприятий при выявлении гинекологического заболевания;

в) персонализированное консультирование девочек и их законных представителей по вопросам интимной гигиены, риска заражения инфекциями, передаваемыми половым путем, профилактики абортов и выбора контрацепции;

г) санитарно-гигиеническое просвещение девочек, проводимое на территории медицинской организации, и направленное на усвоение стереотипа здорового образа жизни, приобретение навыков ответственного отношения к семье и своим репродуктивным возможностям с использованием эффективных информационно-просветительных моделей.

3. Первая медико-санитарная помощь девочкам с целью профилактики, диагностики и лечения гинекологических заболеваний оказывается в рамках реализации профилактических осмотров несовершеннолетних в соответствии с Приказом Минздрава России от 10.08.2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических осмотров несовершеннолетних».

4. Первая медико-санитарная помощь девочкам в целях выявления гинекологических заболеваний организуется в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара врачом-акушером-гинекологом, прошедшим тематическое усовершенствование по особенностям формирования репродуктивной системы и течения гинекологической патологии у детей, а в случае отсутствия указанного врача-специалиста - любым врачом-акушером-

гинекологом, врачом-педиатром, врачом-педиатром участковым, врачом общей практики (семейным врачом), фельдшером, акушеркой или медицинской сестрой фельдшерско-акушерского пункта.

Девочкам, проживающим в отдаленных и труднодоступных районах, первичная медико-санитарная помощь оказывается врачами-акушерами-гинекологами, врачами-педиатрами, врачами-специалистами или другими медицинскими работниками в составе выездных бригад.

Врачи-акушеры-гинекологи, оказывающие медицинскую помощь девочкам с гинекологическими заболеваниями, должны направляться на обучение на цикле тематического усовершенствования по особенностям формирования репродуктивной системы и течения гинекологической патологии у детей не реже 1 раза в 5 лет.

5. Основной обязанностью врача-акушера-гинеколога или другого медицинского работника при оказании первичной медико-санитарной помощи является проведение профилактических осмотров девочек в возрасте 3, 7, 12, 14, 15, 16 и 17 лет включительно в целях предупреждения и ранней диагностики гинекологических заболеваний и патологии молочных желез.

В остальные возрастные периоды осмотр девочки проводится врачом-педиатром, врачом-педиатром участковым, врачом общей практики (семейным врачом), фельдшером, акушеркой или медицинской сестрой фельдшерско-акушерского пункта и осуществляется направление девочки к врачу-акушеру-гинекологу в соответствии с перечнем показаний согласно приложению № 21 к Порядку оказания акушерско-гинекологической помощи, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 572н.

6. При проведении профилактических медицинских осмотров девочек декретируемых возрастов после получения информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство врач-акушер-гинеколог или иной медицинский работник осуществляет выяснение жалоб, проводит общий осмотр, измерение роста и массы тела с определением их соответствия возрастным нормативам, оценку степени полового развития по Таннеру, осмотр и ручное исследование молочных желез и наружных половых органов, консультирование по вопросам личной гигиены и полового развития. При профилактическом осмотре девочки в возрасте до 15 лет разрешается присутствие ее законного представителя.

7. По результатам профилактических осмотров девочек формируются группы состояния здоровья:

I группа - практически здоровые девочки; девочки с факторами риска формирования патологии репродуктивной системы;

II группа - девочки с расстройствами менструаций в год наблюдения (менее 12 месяцев); с функциональными кистами яичников; с доброкачественными болезнями молочных желез; с травмой и с острым воспалением внутренних половых органов при отсутствии осложнений основного заболевания;

III группа - девочки с расстройствами менструаций в течение более 12 месяцев; с доброкачественными образованиями матки и ее придатков; с нарушением полового развития; с пороками развития половых органов без

нарушения оттока менструальной крови; с хроническими, в том числе рецидивирующими, болезнями наружных и внутренних половых органов при отсутствии осложнений основного заболевания, а также при их сочетании с экстрагенитальной, в том числе эндокринной, патологией в стадии компенсации;

IV группа - девочки с нарушением полового развития; с пороками развития половых органов, сопровождающимися нарушением оттока менструальной крови; с расстройствами менструаций и с хроническими болезнями наружных и внутренних половых органов в активной стадии, стадии нестойкой клинической ремиссии и частыми обострениями, требующими поддерживающей терапии; с возможными осложнениями основного заболевания; с ограниченными возможностями обучения и труда вследствие основного заболевания; с сопутствующей экстрагенитальной, в том числе эндокринной, патологией с неполной компенсацией соответствующих функций;

V группа - девочки-инвалиды с сопутствующими нарушениями полового развития, расстройствами менструаций и заболеваниями наружных и внутренних половых органов.

Девочки из I и II группы состояния здоровья подлежат плановым профилактическим осмотрам врачом-акушером-гинекологом или другим медицинским работником.

Девочкам, отнесенными к III, IV, V группам состояния здоровья, в зависимости от выявленных заболеваний составляется индивидуальная программа лечения, при необходимости за ними устанавливается диспансерное наблюдение по месту жительства.

Группы диспансерного наблюдения:

- 1 диспансерная группа - девочки с нарушением полового развития;
- 2 диспансерная группа - девочки с гинекологическими заболеваниями;

3 диспансерная группа - девочки с расстройствами менструаций на фоне хронической экстрагенитальной, в том числе эндокринной патологии.

8. Медицинские вмешательства проводятся после получения информированного добровольного согласия девочек в возрасте 15 лет и старше, а в случае обследования и лечения детей, не достигших указанного возраста, а также признанных в установленном законом порядке недееспособными, если они по своему состоянию не способны дать информированное добровольное согласие, - при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей или иного законного представителя.

9. При наличии беременности любого срока у девочки в возрасте до 17 лет включительно наблюдение ее осуществляется врачом-акушером-гинекологом медицинской организации.

При отсутствии врача-акушера-гинеколога девочки с беременностью любого срока наблюдаются врачом общей практики (семейным врачом), врачом-терапевтом, врачом-педиатром, фельдшером, акушеркой или медицинской сестрой фельдшерско-акушерского пункта в соответствии с разделами I - VI Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 572н.

10. Экстренная и неотложная медицинская помощь девочкам с острыми гинекологическими заболеваниями, требующими хирургического лечения, оказывается в медицинских организациях, имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по «акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» и (или) «детской хирургии», «хирургии», имеющих стационар круглосуточного пребывания с отделением анестезиологии-реаниматологии, врачами-акушерами-гинекологами, врачами - детскими хирургами, врачами-хирургами - ГБУ «Республиканская детская клиническая больница им. Е.П. Глинки». При выполнении экстренных хирургических вмешательств на органах малого таза у девочек рекомендуется использовать малоинвазивный доступ (лапароскопия) с обеспечением сохранения функции матки и ее придатков.

Решение вопроса об удалении яичников, маточных труб и матки при выполнении экстренной операции врачами-детскими хирургами или врачами-хирургами рекомендуется согласовывать с врачом-акушером-гинекологом.

11. Для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, врач-акушер-гинеколог или иной медицинский работник направляет девочку с гинекологической патологией в круглосуточный или дневной стационар медицинской организации, имеющей гинекологические койки для детей и лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по «акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» и «педиатрии». Если необходимый объем медицинской помощи в ГБУ «Республиканская детская клиническая больница им. Е.П. Глинки» не оказывается, готовится медицинская документация на иногороднее лечение.

12. При необходимости реабилитационного и восстановительного лечения медицинская помощь девочкам с гинекологическими заболеваниями оказывается в медицинских организациях (санаторно-курортных организациях), имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по «акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)».

13. Девочки, достигшие возраста 18 лет, передаются под наблюдение врача-акушера-гинеколога женской консультации после оформления переводного эпикриза. Врачи женских консультаций обеспечивают прием документов и осмотр девушки для определения группы диспансерного наблюдения.

14. Правила организации деятельности врача-акушера-гинеколога, оказывающего медицинскую помощь девочкам с гинекологическими заболеваниями, определены приложением № 21 к Порядку оказания акушерско-гинекологической помощи, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 572н.

## **IX. Порядок оказания медицинской помощи женщинам при искусственном прерывании беременности.**

1. Искусственное прерывание беременности, в том числе несовершеннолетним, проводится врачом-акушером-гинекологом в медицинских

организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по «акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности)».

2. Искусственное прерывание беременности проводится при наличии информированного добровольного согласия женщины, оформленного в соответствии с приложением № 10 к настоящему приказу.

Искусственное прерывание беременности у несовершеннолетних младше 15 лет, а также несовершеннолетних, больных наркоманией младше 16 лет, проводится на основе добровольного информированного согласия одного из родителей или иного законного представителя.

3. Для получения направления на искусственное прерывание беременности женщина обращается к врачу-акушеру-гинекологу, а в случае его отсутствия к врачу общей практики (семейному врачу), медицинскому работнику фельдшерско-акушерского пункта.

4. При первичном обращении женщины для искусственного прерывания беременности по желанию женщины или по социальному показанию врач-акушер-гинеколог, а в случае его отсутствия - врач общей практики (семейный врач), медицинский работник фельдшерско-акушерского пункта, направляет беременную в кабинет медико-социальной помощи женской консультации для консультирования психологом (медицинским психологом, специалистом по социальной работе). При отсутствии кабинета медико-социальной помощи консультирование проводит медицинский работник с высшим или средним медицинским образованием, прошедший специальное обучение, на основе информированного добровольного согласия женщины.

Правила организации деятельности Центра медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, рекомендуемые штатные нормативы и стандарт оснащения Центра медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, определены приложениями № 31 - 33 к порядку оказания акушерско-гинекологической помощи, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 572н.

5. Врач-акушер-гинеколог при обращении женщины за направлением на искусственное прерывание беременности производит обследование для определения срока беременности и исключения медицинских противопоказаний.

Искусственное прерывание беременности не проводится при наличии острых инфекционных заболеваний и острых воспалительных процессов любой локализации, включая женские половые органы. Прерывание беременности проводится после излечения указанных заболеваний.

При наличии других противопоказаний (заболеваний, состояний, при которых прерывание беременности угрожает жизни или наносит серьезный ущерб здоровью) вопрос решается индивидуально консилиумом врачей.

6. Перед направлением на искусственное прерывание беременности при сроке до двенадцати недель рекомендуется микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов, определение основных групп крови (A, B, 0) и резус-принадлежности, УЗИ органов малого таза. В целях сохранения беременности при

проводении УЗИ органов малого таза беременной женщине демонстрируется изображение эмбриона и его сердцебиение (при наличии сердцебиения).

7. Искусственное прерывание беременности в зависимости от срока беременности, показаний и противопоказаний может быть проведено с использованием медикаментозного или хирургического метода на основании информированного добровольного согласия женщины.

При медикаментозном методе прерывания беременности используются лекарственные средства, зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с инструкциями по медицинскому применению препаратов.

При использовании хирургического метода искусственного прерывания беременности рекомендуется вакуумная аспирация.

8. Прерывание беременности медикаментозным методом проводится в рамках оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи с периодом наблюдения не менее 1,5-2 часов после приема препаратов.

9. Прерывание беременности в сроке до двенадцати недель хирургическим методом проводится в условиях дневных стационаров медицинских организаций и в стационаре. Продолжительность наблюдения женщины в условиях дневного стационара после произведенного без осложнений прерывания беременности определяется лечащим врачом с учетом состояния женщины, но составляет не менее 4 часов.

Искусственное прерывание беременности при сроке до двенадцати недель у женщин с отягощенным акушерским анамнезом (рубец на матке, внематочная беременность), миомой матки, хроническими воспалительными заболеваниями с частыми обострениями, аномалиями развития половых органов и другой гинекологической патологией, при наличии тяжелых экстрагенитальных заболеваний, тяжелых аллергических заболеваний (состояний) производится в условиях стационара.

10. Перед хирургическим прерыванием беременности у первобеременных женщин во всех сроках, а у повторно беременных после восьми недель и при наличии аномалий шейки матки (врожденных или приобретенных в результате оперативных вмешательств, или травм) проводится подготовка шейки матки.

11. Контроль опорожнения полости матки осуществляется путем визуализации удаленных тканей. При необходимости выполняется УЗИ и (или) определение бета-субъединицы хорионического гонадотропина количественным методом в динамике.

12. Вопрос об искусственном прерывании беременности по социальному показанию решается комиссией в составе руководителя медицинской организации, врача-акушера-гинеколога, юриста, специалиста по социальной работе (при его наличии). Комиссия рассматривает письменное заявление женщины, заключение врача-акушера-гинеколога о сроке беременности, документы, подтверждающие наличие социального показания для искусственного прерывания беременности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2012 г. № 98 «О социальном показании для искусственного прерывания

беременности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 7, ст. 878).

При наличии социального показания для искусственного прерывания беременности комиссией выдается заключение, заверенное подписями членов комиссии и печатью медицинской организации.

13. Для подтверждения наличия медицинских показаний для прерывания беременности, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 декабря 2007 г. № 736 (зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2007 г. № 10807), с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 27 декабря 2011 г. № 1661н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2012 г. № 23119), в медицинских организациях формируется комиссия в составе врача-акушера-гинеколога, врача той специальности, к которой относится заболевание (состояние) беременной женщины, являющееся медицинским показанием для искусственного прерывания беременности, и руководителя медицинской организации (далее - Комиссия).

Персональный состав Комиссии и порядок ее деятельности определяется руководителем медицинской организации.

При наличии медицинских показаний для проведения искусственного прерывания беременности Комиссией выдается заключение о наличии у беременной женщины заболевания, являющегося показанием для проведения искусственного прерывания беременности, заверенное подписями членов Комиссии и печатью медицинской организации.

14. Перед направлением на искусственное прерывание беременности во II триместре проводится обследование: общий (клинический) анализ крови развернутый, анализ крови биохимический общетерапевтический, коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза), определение антител классов M, G к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в крови, определение антител классов M, G к антигену вирусного гепатита В и вирусному гепатиту С в крови, определение антител к бледной трепонеме в крови, определение основных групп крови (A, B, 0) и резус-принадлежности, анализ мочи общий, микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов, УЗИ матки и придатков трансабдоминальное (трансвагинальное), регистрация электрокардиограммы, прием врача-терапевта. По показаниям проводятся консультации смежных врачей-специалистов.

15. Искусственное прерывание беременности по медицинским показаниям при сроке до 22 недель беременности проводится в условиях гинекологического отделения многопрофильной больницы, имеющей возможность оказания специализированной (в том числе реанимационной) помощи женщине (при обязательном наличии врачей-специалистов соответствующего профиля, по которому определены показания для искусственного прерывания беременности).

16. Прерывание беременности (родоразрешение) по медицинским показаниям с 22 недель беременности проводится только в условиях акушерского стационара, имеющего возможность оказания специализированной (в том числе реанимационной) помощи женщине с учетом основного заболевания и новорожденному, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела.

17. Для прерывания беременности сроком более двенадцати недель рекомендуется как хирургический, так и медикаментозные методы.

18. Перед хирургическим абортом при сроке беременности более двенадцати недель всем женщинам проводится подготовка шейки матки.

19. Хирургический аборт во втором триместре рекомендуется проводить под контролем УЗИ.

20. При наличии признаков неполного аборта и (или) обнаружении остатков плодного яйца независимо от примененного метода искусственного прерывания беременности проводится вакуумная аспирация или кюретаж.

После выделения плаценты проводится ее осмотр с целью определения целостности.

21. При прерывании беременности в сроке 22 недели и более при наличии врожденных аномалий (пороков развития) у плода, несовместимых с жизнью, перед искусственным прерыванием беременности проводится интракардиальное введение хлорида калия или дигоксина.

22. Всем женщинам, которым выполняется хирургический аборт, проводится антибиотикопрофилактика.

При проведении медикаментозного аборта антибиотикопрофилактика проводится при высоком риске возникновения воспалительных заболеваний.

23. Искусственное прерывание беременности осуществляется с обязательным обезболиванием на основе информированного добровольного согласия женщины.


24. После искусственного прерывания беременности женщинам с резус-отрицательной принадлежностью крови независимо от метода прерывания беременности проводится иммунизация иммуноглобулином антирезус Rho (Д) человека в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата.

25. После искусственного прерывания беременности с каждой женщиной проводится консультирование, в процессе которого обсуждаются признаки осложнений, при которых женщина обязана незамедлительно обратиться к врачу; предоставляются рекомендации о режиме, гигиенических мероприятиях, а также по предупреждению абортов и необходимости сохранения и вынашивания следующей беременности.

26. После искусственного прерывания беременности контрольный осмотр врача-акушера-гинеколога при отсутствии жалоб проводится через 9-15 дней.

## Лист маршрутизации беременных женщин при проведении пренатальной диагностики

Приложение № 2 к приказу Минздрава ЧР  
от « » 2019 г. №



I УЗИ скрининг проводится на УЗ аппарате экспертного класса по листу маршрутизации,

II УЗИ скрининг проводится на УЗ аппарате экспертного класса по месту наблюдения беременной женщины,

III УЗИ скрининг проводится по месту наблюдения беременной женщины (желательно на УЗ аппарате экспертного класса).

**Протокол  
УЗИ в 11-14 недель беременности**

Дата обследования: «  » 20    г.

Вид обследования: трансабдоминальный, трансвагинальный

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ возраст \_\_\_\_\_

1-й день последней менструации «  » 20    г.

Срок беременности        недель        дней.

В полости матки (не) определяется плод(а):

Средний внутренний диаметр плодного яйца        мм,

КТР        мм. соответствует сроку беременности        нед.        дня

Толщина воротникового пространства        мм

Носовая кость (не) визуализируется        мм.

Сердцебиение плода        ударов в 1 мин

Венозный проток \_\_\_\_\_

Лицевые структуры: профиль \_\_\_\_\_

Носогубный треугольник \_\_\_\_\_

Глазницы \_\_\_\_\_

Позвоночник \_\_\_\_\_ Легкие \_\_\_\_\_

Желудок \_\_\_\_\_ Кишечник \_\_\_\_\_

Мочевой пузырь \_\_\_\_\_ Почки \_\_\_\_\_

Верхние/ нижние конечности \_\_\_\_\_

Передняя брюшная стенка \_\_\_\_\_

Место прикрепления пуповины к передней брюшной стенке \_\_\_\_\_

Желточный мешок: (не) визуализируется,

Средний внутренний диаметр желточного мешка        мм.

Врожденные пороки развития плода \_\_\_\_\_

Хорион/плацента располагается по \_\_\_\_\_ стенке матки

Структура хориона/плаценты \_\_\_\_\_

Шейка матки, внутренний зев        мм., длина ш/м        мм \_\_\_\_\_

Миометрий \_\_\_\_\_

Область придатков \_\_\_\_\_

Визуализация: удовлетворительная / затруднена

Заключение: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Рекомендации: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ф.И.О. врача \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

Протокол  
УЗИ во II-III триместрах беременности

Дата обследования «\_\_» 20 \_\_ г.

Вид обследования: трансабдоминальный, трансвагинальный

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ Возраст \_\_\_\_\_

Первы день последней менструации \_\_\_\_\_ Срок беременности \_\_\_\_\_ нед.

Имеется \_\_\_\_\_ живой(ых) плод(ов) в головном / тазовом предлежании

ФЕТОМЕТРИЯ:

Бипариетальный размер головы \_\_\_\_\_ мм Окружность головы \_\_\_\_\_ мм

Лобно - затылочный размер \_\_\_\_\_ мм диаметр окружность живота \_\_\_\_\_ мм

Длина бедренной кости: левой \_\_\_\_\_ мм правой \_\_\_\_\_ мм

Длина костей голени: левой \_\_\_\_\_ мм правой \_\_\_\_\_ мм

Длина плечевой кости: левой \_\_\_\_\_ мм правой \_\_\_\_\_ мм

Длина костей предплечья: левого \_\_\_\_\_ мм правого \_\_\_\_\_ мм

Размеры плода: соответствуют \_\_\_\_\_ нед.

АНАТОМИЯ ПЛОДА:

Боковые желудочки мозга \_\_\_\_\_ Мозжечок \_\_\_\_\_

Большая цистерна \_\_\_\_\_ Позвоночник \_\_\_\_\_

Лицевые структуры: профиль \_\_\_\_\_

Носогубный треугольник \_\_\_\_\_ Глазницы \_\_\_\_\_

Легкие \_\_\_\_\_ 4-камерный срез сердца \_\_\_\_\_

Выход магистральных сосудов \_\_\_\_\_ Дуга аорты \_\_\_\_\_

Желудок \_\_\_\_\_ Кишечник \_\_\_\_\_

Мочевой пузырь \_\_\_\_\_ Почки \_\_\_\_\_

ПЛАЦЕНТА, ПУПОВИНА, ОКОЛОПЛОДНЫЕ ВОДЫ:

Плацента расположена в дне по передней, задней стенке матки, больше справа/слева, на \_\_\_\_\_ см. выше внутреннего зева \_\_\_\_\_

Толщина плаценты: нормальная, уменьшена / увеличена до \_\_\_\_\_ мм.

Структура плаценты \_\_\_\_\_

Степень зрелости \_\_\_\_\_ что соответствует/не соответствует сроку беременности.

Пуповина имеет \_\_\_\_\_ сосуда

Количество околоплодных вод: нормальное, многоводие / маловодие

Индекс амниотической жидкости \_\_\_\_\_ см.

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ: данных не обнаружено

Обнаружены: \_\_\_\_\_

ШЕЙКА МАТКИ: внутренний зев \_\_\_\_\_ длина ш/м \_\_\_\_\_

СТЕНКИ МАТКИ: особенности строения \_\_\_\_\_

ОБЛАСТЬ ПРИДАТКОВ \_\_\_\_\_

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ: удовлетворительная/затруднена

ДОППЛЕРОМЕТРИЯ

Кровоток в: артериях пуповины

PI \_\_\_\_\_ RI \_\_\_\_\_ S\I \_\_\_\_\_

Маточная артерия правая \_\_\_\_\_ левая \_\_\_\_\_ Средняя мозговая артерия \_\_\_\_\_


ЗАКЛЮЧЕНИЕ: \_\_\_\_\_

РЕКОМЕНДАЦИИ \_\_\_\_\_

Ф.И.О. врача \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

## Лист маршрутизации женщин в период беременности и родов при акушерской патологии

Приложение № 5 к приказу Минздрава ЧР  
от « » 2019 г. №




Все преждевременные роды в сроке 22-36 недель включительно, направляются в ГБУ «Родильный Дом».  
При наличии у плода ВПС, требующего экстренной хирургической помощи после рождения ребенка, беременная женщина направляется на родоразрешение в федеральный центр. При наличии у плода ВПС, требующего планового хирургического вмешательства беременная женщина направляется на родоразрешение в ГБУ «Родильный Дом».

При наличии у плода ВПР, требующего экстренной хирургической помощи после рождения ребенка, беременная женщина направляется на родоразрешение в ГБУ «Родильный Дом», при условии, что данный прокт там оперируется, а также при наличии у плода ВПР, требующего планового хирургического вмешательства, в остальных случаях - в федеральный центр.

**Лист маршрутизации женщин в период беременности и послеродовый период с  
экстрагенитальной патологией, нуждающихся в лечении в специализированном отделении**

Приложение № 6 к приказу Минздрава  
от « » 2019 г. №



Низкого и среднего риска из г. Грозный в специализированные отделения МО г. Грозный:  
«ГКБ № 3», «ГКБ № 4», «ГКБ № 5».

**Экстренные случаи, а также в нерабочее время, в выходные и в праздничные дни госпитализация осуществляется в ГБУ «ГКБ № 1 г. Грозного», по согласованию в специализированные МО республики.**

(рабочее время: для МО с б дневным рабочим днем с 9:00 до 16:30; для МО с дневным рабочим днем с 9:00 до 17:50)

## **Положение о дистанционном акушерском консультативном центре**

### **1. Общие положения:**

- 1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности дистанционного акушерского консультативного центра с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи родильного дома;
- 1.2. Дистанционный акушерский консультативный центр (далее - ДАКЦ) является структурным подразделением ГБУ «Родильный дом»;
- 1.3. Финансовое и иное обеспечение деятельности ДАКЦ осуществляют ГБУ «Родильный дом» в пределах утвержденной сметы доходов и расходов;
- 1.4. Руководство ДАКЦ осуществляют главный врач ГБУ «Родильный дом»;
- 1.5. ДАКЦ подчиняется заместителю главного врача родильного дома и при отсутствии вызовов и консультаций медицинские работники акушерского дистанционного консультативного центра могут привлекаться для работы в других подразделениях медицинской организации.

### **2. Основные функции ДАКЦ:**

ДАКЦ организован с целью оказания неотложной медицинской помощи и проведения реанимационных и лечебных мероприятий женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе во время транспортировки.

1. Основными функциями акушерского дистанционного консультативного центра являются:

- 1.1. Организация системы оказания медицинской помощи женщинам с угрожающими жизни заболеваниями или клиническими ситуациями, осложнившими течение беременности, родов и послеродового периода, такими как:  
пре- и эклампсия;  
HELLP-синдром;  
острый жировой гепатоз беременных;  
предлежание плаценты с эпизодами кровотечений в предшествующие периоды беременности;  
преждевременная отслойка плаценты с кровопотерей более 1000 мл;  
рубец на матке с клиническими или инструментальными проявлениями несостоятельности;  
тяжелая рвота беременных;  
внематочная беременность с кровопотерей более 1000 мл;  
шеечно-перешеечная беременность;  
послеродовая (послеабортная) кровопотеря более 1000 мл;  
интраоперационные осложнения, связанные с ранением смежных органов или массивной кровопотерей (более 1500 мл);  
тяжелый септический послеродовой (послеоперационный) метроэндометрит;

послеоперационный (послеродовой) перитонит;  
послеродовой сепсис;  
сепсис во время беременности любой этиологии;  
ятрогенные осложнения (осложнения анестезии, трансфузионные осложнения и так далее);  
гипертоническая болезнь II степени со стойким повышением давления выше 160/100 мм рт. ст. или эпизодической гипертензией до 200/120 мм рт. ст.;  
пороки сердца с нарушением кровообращения I степени, легочной гипертензией или другими проявлениями декомпенсации;  
миокардиодистрофия, кардиомиопатия с нарушениями ритма или недостаточностью кровообращения;  
тяжелый пиелонефрит с нарушением пассажа мочи, карбункул, апостематоз почек, пиелонефрит единственной почки;  
бронхиальная астма тяжелой степени, гормонозависимая;  
другие заболевания легких с явлениями умеренной дыхательной недостаточности;  
сахарный диабет с труднокорригируемым уровнем сахара в крови и склонность к кетоацидозу;  
тяжелая анемия любого генеза;  
тромбоцитопения любого происхождения;  
острые нарушения мозгового кровообращения, кровоизлияния в мозг; тяжелая форма эпилепсии;  
миастения;

1.2. Круглосуточная экстренная очная (выездная) и заочная консультативная и лечебная помощь, женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период;

1.3. Экстренная транспортировка и госпитализация женщин в период беременности, родов и в послеродовой период при наличии показаний в отделение анестезиологии-реаниматологии;

1.4. Дистанционное динамическое наблюдение за состоянием здоровья беременных женщин с осложненным течением беременности;

1.5. Обеспечение оперативной информацией (о количестве тяжелых больных, характере и степени тяжести выявленной патологии, результатах лечебно-диагностических мероприятий) руководства органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья;

1.6. Проведение анализа дефектов в оказании неотложной помощи женщинам в акушерских стационарах;

1.7. Ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

1.8. В случае необходимости и с целью обеспечения экстренной транспортировки больных из труднодоступных районов акушерский дистанционный консультативный центр взаимодействует с региональными центрами Всероссийской службы медицины катастроф, структурными подразделениями Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и медицинскими организациями, на которые возложены функции обеспечения скорой специализированной

(санитарно-авиационной) медицинской помощи.

1.9. Взаимозаменяемость медицинских работников акушерского дистанционного консультативного центра и медицинских работников отделений (акушерских, анестезиологии-реаниматологии) является основным принципом работы.

**ДАКЦ вправе:**

1. Привлекать для консультативной и лечебной помощи профильных и смежных специалистов из медицинских учреждений здравоохранения республики, главных штатных и внештатных специалистов министерства здравоохранения Чеченской Республики (по согласованию);

2. Получать медицинскую документацию, статистические данные и информацию о деятельности лечебных учреждений республики.

**3. Работа ДАКЦ по оказанию круглосуточной экстренной очной (выездной) и заочной консультативной и лечебной помощи женщинам в период беременности родов и в послеродовой период:**

3.1. ДАКЦ для оказания круглосуточной экстренной, заочной и очной консультативной и лечебной помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период обеспечивает круглосуточное присутствие бригады: врач акушер-гинеколог, врач анестезиолог-реаниматолог, медицинская сестра - анестезиистка, водитель;

3.2. Поступившее сообщение в ДАКЦ регистрируется в журнале регистрации обращений (пронумерованный, прошнурованный, заверенный главным врачом);

3.4. Дежурный врач акушер-гинеколог и/или врач анестезиолог-реаниматолог ДАКЦ на основании полученной информации: заполняет формализованную историю болезни (далее - ФИБ), согласно приложению № 8 к настоящему приказу. Предоставляет необходимую консультацию или организует проведение консультации соответствующим профильным специалистом и совместно принимают одно из следующих тактических решений:

- рекомендации по госпитализации в акушерский стационар или специализированное отделение на соответствующий уровень;

- проведение дистанционного наблюдения за тактикой ведения и лечения женщины, нуждающейся в реанимации и интенсивной терапии;

- срочный (неотложный) выезд в лечебное учреждение;

3.5. Дежурный врач предоставляет информацию о поступившем сообщении и согласовывает принятое тактическое решение с заместителем главного врача по медицинской части и заведующим ОАиР ГБУ «Родильный дом»;

3.6. В случае сложной диагностики и/или решения вопроса о целесообразности транспортировки женщины в период беременности, родов и в послеродовой период, нуждающейся в реанимации и/или интенсивной терапии, заместитель главного врача согласовывает принятое тактическое решение с главным анестезиологом-реаниматологом Министерства здравоохранения Чеченской Республики.

**4. Организация срочного (неотложного) выезда в лечебное учреждение:**

4.1. Решение о срочном (неотложном) выезде в лечебное учреждение принимается дежурными врачами ДАКЦ, согласованно с заместителем главного врача по медицинской части ГБУ «Родильный дом»;

4.2. В лечебное учреждение сообщается решение о принятом срочном (неотложном) выезде и рекомендации по тактике ведения пациентки, проведения необходимого лабораторно-диагностического обследования и лечения на период организации выезда;

4.3. В ДАКЦ в журнале регистрации обращений фиксируется поступившая информация;

4.4. Специалисты ДАКЦ, осуществляющие срочный (неотложный) выезд в лечебное учреждение, проводят подготовку к выезду в течение не более тридцати минут;

4.5. Дежурный врач ДАКЦ проводит необходимые мероприятия по подготовке условий выезда;

4.6. Диспетчер отделения ДАКЦ сообщает в лечебное учреждение сведения об условиях срочного (неотложного) выезда, дату и час выезда, состав бригады, осуществляющей выезд.

## **5. Организация экстренной транспортировки беременной/роженицы/родильницы:**

5.1. Решение о транспортировке женщин в период беременности, родов, и в послеродовой период, нуждающихся в реанимации и/или интенсивной терапии, из лечебного учреждения принимается согласованно (по телефону) врачом акушером-гинекологом и/или врачом анестезиологом-реаниматологом ДАКЦ, осуществляющими срочный (неотложный) выезд в лечебное учреждение;

5.2. Дежурный врач согласовывает принятое решение о транспортировке женщин с заместителем главного врача по медицинской части ГБУ «Родильный дом»;

5.3. В случае сложной диагностики и/или решения вопроса о целесообразности транспортировки женщин в период беременности, родов и в послеродовой период, заместитель главного врача согласовывает принятое решение о транспортировке женщины с главным анестезиологом-реаниматологом Министерства здравоохранения Чеченской республики;

5.4. Данные о состоянии пациентки на этапе подготовки и во время транспортировки заносятся в Карту транспортировки, согласно приложению № 9 к данному приказу;

5.5. В ДАКЦ в журнале регистрации обращений фиксируется результат выезда в лечебное учреждение.

## **6. Дистанционное наблюдение за состоянием женщин в период беременности, родов и в послеродовой период, находящихся в лечебных учреждениях и нуждающихся в реанимации и/или интенсивной терапии**

6.1. Дежурный врач акушер-гинеколог и/или анестезиолог-реаниматолог ДАКЦ, принявший решение проводить дистанционное наблюдение за пациенткой, нуждающейся в реанимации и/или интенсивной терапии, на основании полученной информации заполняет ФИБ и дает необходимые рекомендации по тактике ведения, лечения, проведения лабораторных и инструментальных методов исследования, периодичности консультирования, определяет показания и срок перевода на следующий этап лечения или организует проведение консультации соответствующим профильным и/или смежным специалистом;

6.2. Каждый случай обращения врач ДАКЦ регистрирует в журнале регистрации обращений;

6.3. При каждой последующей консультации врач ДАКЦ вносит данные в

ФИБ;

6.4. В случае необходимости перевода пациентки на следующий этап лечения, дежурный врач акушер-гинеколог и/или врач анестезиолог- реаниматолог ДАКЦ совместно с заведующим определяют показания и условия транспортировки;

6.5. Дежурный врач согласовывает принятное решение о проведении дистанционного наблюдения за пациенткой, нуждающейся в реанимации и/или интенсивной терапии, с заместителем главного врача по медицинской части ГБУ «Родильный дом»;

6.6. Заместитель главного врача ежедневно предоставляет главному анестезиологу-реаниматологу и главному акушеру-гинекологу министерства здравоохранения Чеченской Республики информацию о женщинах, состоящих на дистанционном наблюдении в ДАКЦ.

**консультации с дистанционным акушерским консультативным центром  
(формализованная история болезни - ФИБ)**

Дата «   » 20    г. время обращения    час.    мин.

Медицинская организация \_\_\_\_\_

Ф.И.О. врача \_\_\_\_\_

Ф.И.О. больной \_\_\_\_\_ возраст \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Перенесенные заболевания \_\_\_\_\_

Аллергоанамнез \_\_\_\_\_ Эпиданамнез \_\_\_\_\_

Соматические заболевания \_\_\_\_\_

Гемотрансфузия \_\_\_\_\_ Здоровье мужа \_\_\_\_\_

Гинекологические заболевания \_\_\_\_\_

Предыдущие беременности \_\_\_\_\_ исход \_\_\_\_\_

Течение настоящей беременности: I триместр \_\_\_\_\_

II триместр \_\_\_\_\_

III триместр \_\_\_\_\_

Срок беременности: \_\_\_\_\_ по УЗД \_\_\_\_\_

**Объективные данные: жалобы** \_\_\_\_\_

Общее состояние \_\_\_\_\_ сознание \_\_\_\_\_

кожа \_\_\_\_\_ отеки \_\_\_\_\_ температура \_\_\_\_\_

сердечные тоны \_\_\_\_\_ АД пр.р. \_\_\_\_\_ лев.р. \_\_\_\_\_ пульс \_\_\_\_\_

органы дыхания \_\_\_\_\_

органы пищеварения \_\_\_\_\_

мочевыделительная система \_\_\_\_\_ диурез \_\_\_\_\_ мл. (с    ч.    мин. по    ч.    мин.)

Акушерский статус: размеры таза \_\_\_\_\_ ОЖ \_\_\_\_\_ ВДМ \_\_\_\_\_ ПМП \_\_\_\_\_

тонус матки \_\_\_\_\_ схватки \_\_\_\_\_ через \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

положение плода \_\_\_\_\_ предлежание плода \_\_\_\_\_ С/б плода \_\_\_\_\_

Влагалищное исследование: влагалище \_\_\_\_\_ шейка матки (положение) \_\_\_\_\_

Длина \_\_\_\_\_ консистенция \_\_\_\_\_ края \_\_\_\_\_ открытие \_\_\_\_\_

плодный пузырь \_\_\_\_\_ выделения \_\_\_\_\_ предлежащая часть \_\_\_\_\_

Данные лабораторных исследований: ОАК: \_\_\_\_\_

ОАМ: \_\_\_\_\_

Биохимический анализ крови: \_\_\_\_\_

Коагулограмма: \_\_\_\_\_

Данные УЗИ: \_\_\_\_\_

Диагноз: \_\_\_\_\_

План ведения \_\_\_\_\_

Рекомендации \_\_\_\_\_

Ф.И.О. консультанта \_\_\_\_\_

Ф.И.О. (подпись) лечащего врача \_\_\_\_\_

## КАРТА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ Возраст \_\_\_\_\_

Диагноз: \_\_\_\_\_

Показание к переводу \_\_\_\_\_

Показание к переводу установлено: дата \_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_

Состояние: \_\_\_\_\_

Клинические особенности: \_\_\_\_\_

Схватки: есть/нет, через \_\_\_\_\_ минут, по \_\_\_\_\_ секунд

Выделения из половых путей: есть/нет \_\_\_\_\_ характер \_\_\_\_\_

Плод: положение \_\_\_\_\_ предлежание \_\_\_\_\_

Сердечная активность плода: \_\_\_\_\_

Температура \_\_\_\_\_ °C, Пульс \_\_\_\_\_ АД \_\_\_\_\_ мм. рт. ст., Диурез \_\_\_\_\_ мл.

### Подготовка к транспортировке

Выполнено: \_\_\_\_\_

Переводится в: \_\_\_\_\_

Врач: \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Транспортировка: начало дата \_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_

I. Время _____	Состояние _____
Схватки: есть/нет через _____	по _____
Выделения из половых путей: _____	
Температура _____ °C, Пульс _____	в мин., АД _____
мм. рт.ст., Диурез _____ мл	
Дополнительные данные: _____	

II. Время _____	Состояние _____
Схватки: есть/нет через _____	по _____
Выделения из половых путей: _____	
Температура _____ °C, Пульс _____	в мин., АД _____
мм. рт.ст., Диурез _____ мл	
Дополнительные данные: _____	

III. Время _____	Состояние _____
Схватки: есть/нет через _____	по _____
Выделения из половых путей: _____	
Температура _____ °C, Пульс _____	в мин., АД _____
мм. рт.ст., Диурез _____ мл	
Дополнительные данные: _____	

Окончание транспортировки: дата \_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_  
(должны совпадать со временем поступления в стационар)

Состояние _____	
Схватки: есть/нет через _____	по _____
Выделения из половых путей: _____	
Температура _____ °C, Пульс _____	в мин., АД _____
мм. рт.ст., Диурез _____ мл	
Сердечная активность плода: _____	
Дополнительные данные: _____	

Объективную оценку состояния пациентки проводить совместно с принимающим врачом

Медицинский \_\_\_\_\_ работник, \_\_\_\_\_ участвующий в транспортировке Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Врач \_\_\_\_\_ учреждения, \_\_\_\_\_ куда переведена Ф.И.О. \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ пациентка

**Информированное добровольное согласие  
на проведение искусственного прерывания беременности  
по желанию женщины**

Я, нижеподписавшаяся, \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ года рождения в соответствии со статьями 20 и 56 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" настоящим подтверждаю свое согласие на проведение мне искусственного прерывания беременности (нужное подчеркнуть):

медикаментозным методом;

путем хирургической операции с разрушением и удалением плодного яйца (эмбриона человека), которая проводится под обезболиванием.

1. Перед направлением на искусственное прерывание беременности мне предоставлено время для обдумывания и принятия окончательного решения в течение (нужное подчеркнуть):

48 часов;

7 дней.

В течение указанного периода:

я проинформирована о сроке моей беременности, об отсутствии у меня медицинских противопоказаний к вынашиванию данной беременности и рождению ребенка; мне проведено / не проведено (нужное подчеркнуть) ультразвуковое исследование (далее - УЗИ) органов малого таза, в процессе которого продемонстрировано изображение эмбриона и его сердцебиение (при наличии сердцебиения): " \_\_ \_ 20 \_ г. (указать дату проведения согласно отметке в медицинской документации или дату отказа от медицинского вмешательства, оформленного в установленном порядке);

я проконсультирована психологом (медицинским психологом, специалистом по социальной работе) по вопросам психологической и социальной поддержки.

2. Я проинформирована врачом-акушером-гинекологом:

о том, что имею право не делать искусственное прерывание беременности и не прерывать беременность;

о том, что при условии строжайшего соблюдения правил проведения искусственного прерывания беременности могут возникнуть следующие осложнения:

после проведения искусственного прерывания беременности, в том числе в качестве отдаленных последствий:

бесплодие;

хронические воспалительные процессы матки и (или) придатков матки; нарушение функции яичников; тазовые боли; внематочная беременность; невынашивание беременности; различные осложнения при вынашивании последующей беременности и в родах - преждевременные роды, различные осложнения родовой деятельности, кровотечение в родах и (или) послеродовом периоде; психические расстройства; опухолевые процессы матки;

скопление крови в полости матки; остатки плодного яйца в полости матки, острый и (или) подострый воспалительный процесс матки и (или) придатков матки, вплоть до перитонита, что потребует повторного оперативного вмешательства, не исключая удаления придатков матки и матки;

во время проведения искусственного прерывания беременности:  
осложнения анестезиологического пособия;  
травма и прободение матки с возможным ранением внутренних органов и кровеносных сосудов;  
кровотечение, что может потребовать расширения объема операции вплоть до чревосечения и удаления матки, хирургического вмешательства на внутренних органах.

3. Мне даны разъяснения врачом-акушером-гинекологом о:

механизме действия назначаемых мне перед проведением и во время проведения искусственного прерывания беременности лекарственных препаратов для медицинского применения и возможных осложнениях при их применении;  
основных этапах обезболивания;  
необходимости прохождения медицинского обследования для контроля за состоянием моего здоровья после проведения искусственного прерывания беременности;  
необходимости приема лекарственных препаратов для медицинского применения в соответствии с назначениями лечащего врача;  
режиме поведения, в том числе половой жизни, гигиенических мероприятий после проведения искусственного прерывания беременности и возможных последствиях в случае несоблюдения рекомендаций;  
методах предупреждения нежелательной беременности;  
сроках контрольного осмотра врачом-акушером-гинекологом.

4. Я имела возможность задавать любые вопросы и на все вопросы получила исчерпывающие ответы. Мне разъяснены возможность не прибегать к искусственному прерыванию беременности и предпочтительность сохранения и вынашивания беременности и рождения ребенка.

#### 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Получив полную информацию о возможных последствиях и осложнениях в связи с проведением искусственного прерывания беременности, я подтверждаю, что мне понятен смысл всех терминов, на меня не оказывалось давление, и я осознанно принимаю решение о проведении мне искусственного прерывания беременности.

Пациент

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Дата "\_\_\_" 20\_г.

6. Я свидетельствую, что разъяснил пациентке суть, ход выполнения, негативные последствия проведения искусственного прерывания беременности, возможность не прибегать к нему и предпочтительность вынашивания беременности и рождения ребенка, дал ответы на все вопросы.

7. Подтверждаю, что рекомендовал пациентке проведение УЗИ органов малого таза для демонстрации изображения эмбриона и его сердцебиения (при наличии сердцебиения).

Врач-акушер-гинеколог

(имя, отчество, фамилия)

(подпись)

Дата "\_\_\_" 20\_\_\_г.